

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

11 Veröffentlichungsnummer:

0 094 349
A2

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 83810188.3

51 Int. Cl.: C 07 D 215/26, C 07 D 215/28,
A 01 N 43/42

22 Anmeldetag: 02.05.83

30 Priorität: 07.05.82 CH 2841/82

71 Anmelder: CIBA-GEIGY AG, Patentabteilung Postfach,
CH-4002 Basel (CH)


43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 16.11.83
Patentblatt 83/46

84 Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR IT LI NL SE

72 Erfinder: Hubele, Adolf, Dr., Obere Egg 9,
CH-4312 Magden (CH)

84 Verwendung von Chinolinderivaten zum Schützen von Kulturpflanzen.

87 Beim Verfahren zum Schützen von Kulturpflanzen gegen
schädigende Wirkungen von Agrarchemikalien werden Chino-
linderivate der Formel



unsubstituiertes oder substituiertes Derivat einer Carbonsäu-
reamidgruppe oder eine Carbonsäurehydrazidgruppe oder
X und Y zusammen einen unsubstituierten oder substituierten
Tetrahydrofuran-2-on-Ring
bedeuten, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze und Me-
tallkomplexe, oder Mittel, welche solche Derivate enthalten,
eingesetzt. Es werden auch neue Chinolinderivate und ihre Her-
stellung beschrieben.

worin

R₁, R₂ und R₃ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen,
Nitro, Cyan, Alkyl oder Alkoxy,
R₄, R₅ und R₆ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen
oder Alkyl,
X einen aliphatischen, acyclischen, gesättigten Kohlenwasser-
stoffrest mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen und
Y eine Carboxylgruppe oder ein Salz davon, eine Mercaptocar-
bonylgruppe oder ein Salz davon, eine Carbonsäureestergrup-
pe, eine Carbonsäurethiolestergruppe, eine unsubstituierte
oder substituierte Carbonsäureamidgruppe, ein cyclisiertes,

Verwendung von Chinolinderivaten zum Schützen von Kulturpflanzen

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von Chinolinderivaten zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Agrarchemikalien, Mittel, welche diese Chinolinderivate enthalten, neue Chinolinderivate und die Herstellung der Chinolinderivate. Die Chinolinderivate lassen sich auch zur Regulierung des Pflanzenwachstums einsetzen.

Beim Einsatz von Agrarchemikalien, wie Pflanzenschutzmitteln und insbesondere Herbiziden, können in Abhängigkeit von Faktoren wie beispielsweise Dosis der Agrarchemikalie und Applikationsart, Art der Kulturpflanze, Bodenbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen, wie beispielsweise Belichtungsdauer, Temperatur und Niederschlagsmengen, die Kulturpflanzen in gewissem Masse geschädigt werden. So ist beispielsweise bekannt, dass Herbizide aus den verschiedensten Stoffklassen, wie Triazine, Harnstoffderivate, Carbamate, Thiolcarbamate, Halogenacetanilide, Halogenphenoxyessigsäuren und anderen Klassen bei der Anwendung in wirksamer Dosis die Kulturpflanzen, welche gegen die nachteilige Wirkung von unerwünschtem Pflanzenwuchs geschützt werden sollen, in gewissem Masse schädigen können. Um diesem Problem zu begegnen, sind schon verschiedene Stoffe vorgeschlagen worden, welche befähigt sind, die schädigende Wirkung eines Herbizids auf die Kulturpflanze spezifisch zu antagonisieren, d.h., die Kulturpflanze zu schützen, ohne zugleich die Herbizidwirkung gegen zu bekämpfende Unkräuter merklich zu beeinflussen. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass die vorgeschlagenen Gegenmittel häufig nur ein enges Einsatzgebiet haben, d.h., ein bestimmtes Gegenmittel eignet sich oftmals nur zur Anwendung bei einzelnen Kulturpflanzenarten und/oder zum Schutz der Kulturpflanzen gegen einzelne herbizide Substanzen oder Stoffklassen.

So beschreibt die Britische Patentschrift 1,277,557 die Behandlung von Samen bzw. Sprösslingen von Weizen und Sorghum mit gewissen Oxamsäureestern und Amiden zum Schutz vor dem Angriff durch "ALACHLOR" (N-Methoxymethyl-N-chloracetyl-2,6-diäthylanilin). In den Deutschen Offenlegungsschriften 1,952,910 und 2,245,471, sowie in der Französischen Patentschrift 2,021,611 werden Gegenmittel zur Behandlung von Getreide-, Mais- und Reissamen zum Schutz gegen die schädigende Einwirkung von herbizid wirksamen Thiolcarbamaten vorgeschlagen. Gemäss der Deutschen Patentschrift 1,567,075 und der US-Patentschrift 3,131,509 werden Hydroxyaminoacetanilide und Hydantoine für den Schutz von Getreidesamen gegenüber Carbamaten verwendet.


Die direkte pre- oder postemergente Behandlung gewisser Nutzpflanzen mit Gegenmitteln als Antagonisten bestimmter Herbizidklassen auf einer Anbaufläche ist in den Deutschen Offenlegungsschriften 2,141,586 und 2,218,097, sowie im US-Patent 3,867,444 beschrieben.

Ferner können Maispflanzen gemäss der Deutschen Offenlegungsschrift 2,402,983 wirksam vor Schädigung durch Chloracetanilide geschützt werden, indem man dem Boden als Gegenmittel ein N-disubstituiertes Dichloracetamid zuführt.

Gemäss EP-A 11.047 können auch Alkoximinobenzylcyanide, deren Alkoxygruppe u.a. durch eine acetalisierte Carbonylgruppe substituiert ist, als Mittel zum Schutz von Kulturpflanzen vor der schädigenden Wirkung von Herbiziden verschiedener Stoffklassen verwendet werden.

Es wurde nun gefunden, dass sich überraschenderweise eine Gruppe von Chinolinderivaten hervorragend dazu eignet, Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Agrarchemikalien, wie beispielsweise Pflanzenschutzmitteln, insbesondere Herbiziden, zu schützen. Diese Chinolinderivate werden daher im folgenden auch als "Gegenmittel", "Antidot" oder "Safener" bezeichnet. Sie besitzen zusätzlich auch eine pflanzenwuchsregulierende Wirkung und eignen sich besonders zur Wuchsregulierung bei Dicotylen, vor allem zur Ertragssteigerung bei Kulturpflanzen, insbesondere bei Soja. Ferner können Wurzelwachstum und Keimung gefördert werden.

Chinolinderivate, welche zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Agrarchemikalien geeignet sind, entsprechen der Formel I



(I),

worin

R₁, R₂ und R₃ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Nitro, Cyan, Alkyl oder Alkoxy,

R₄, R₅ und R₆ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen oder Alkyl, X einen aliphatischen, acyclischen, gesättigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen und

Y eine Carboxylgruppe oder ein Salz davon, eine Mercaptocarbonylgruppe oder ein Salz davon, eine Carbonsäureestergruppe, eine Carbonsäurethiolestergruppe, eine unsubstituierte oder substituierte Carbonsäureamidgruppe, ein cyclisiertes, unsubstituiertes oder substituiertes Derivat einer Carbonsäureamidgruppe oder eine Carbonsäurehydrazidgruppe oder

X und Y zusammen einen unsubstituierten oder substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring

bedeuten, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze und Metallkomplexe.

Wenn in den Verbindungen der Formel I X für -CH(CH₃)-, -CH(C₂H₅)- oder -CH(A)-CH(E)- steht, wobei A und E die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben, oder X und Y zusammen einen Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden, existieren optisch isomere Verbindungen. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung sind unter den entsprechenden Verbindungen der Formel I sowohl die optisch reinen Isomere wie auch die Isomerengemische zu verstehen.

Unter Halogen sind Fluor, Chlor, Brom und Jod zu verstehen, insbesondere Chlor, Brom und Jod.

Die als Substituenten R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 vorkommenden Alkyl- und Alkoxygruppen können geradkettig oder verzweigt sein. Sie enthalten zweckmässigerweise 1 bis 18, insbesondere 1 bis 6 und bevorzugt 1 bis 3 Kohlenstoffatome.

Für X als aliphatischen, acyclischen, gesättigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen kommen vor allem die folgenden Gruppen in Betracht: $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ oder $-\text{CH}(\text{A})-\text{CH}(\text{E})-$, worin eines der Symbole A und E für Wasserstoff und das andere für eine Methylgruppe steht.

Für Y als Carbonsäureestergruppe oder Carbonsäurethiolestergruppe kommt ein entsprechender Säurerest in Betracht, der beispielsweise durch einen gegebenenfalls substituierten, aliphatischen Rest oder einen gegebenenfalls über einen aliphatischen Rest gebundenen und gegebenenfalls substituierten cycloaliphatischen, aromatischen oder heterocyclischen Rest verestert ist.

Als Carbonsäureesterrest bevorzugt ist der Rest $-\text{COOR}_7$ und als Carbonsäurethiolesterrest bevorzugt ist der Rest $-\text{COSR}_8$, wobei R_7 und R_8 die nachfolgend angegebenen Bedeutungen haben: gegebenenfalls substituierter Alkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Cycloalkyl-, Phenyl- oder Naphthylrest oder gegebenenfalls substituierter heterocyclischer Rest. Die Reste $-\text{COOR}_7$ und $-\text{COSR}_8$ schliessen auch die freien Säuren ein, wobei R_7 und R_8 für Wasserstoff stehen, sowie die Salze davon, wobei R_7 und R_8 für ein Kation stehen. Als Salzbildner eignen sich hier besonders Metalle und organische Stickstoffbasen, vor allem quaternäre Ammoniumbasen. Hierbei kommen als zur Salzbildung geeignete Metalle Erdalkalimetalle, wie Magnesium oder Calcium, vor allem aber die Alkalimetalle in Betracht, wie Lithium und insbesondere Kalium und Natrium. Ferner sind als Salzbildner auch Uebergangsmetalle wie beispielsweise Eisen, Nickel, Kobalt, Kupfer, Zink, Chrom oder Mangan geeignet. Beispiele für zur Salzbildung geeignete Stickstoffbasen sind primäre, sekundäre und tertiäre, aliphatische und aromatische, gegebenenfalls am Kohlen-

wasserstoffrest hydroxylierte Amine, wie Methylamin, Aethylamin, Propylamin, Isopropylamin, die vier isomeren Butylamine, Dimethylamin, Diäthylamin, Dipropylamin, Diisopropylamin, Di-n-butylamin, Pyrrolidin, Piperidin, Morpholin, Trimethylamin, Triäthylamin, Tripropylamin, Chinuclidin, Pyridin, Chinolin, Isochinolin sowie Methanolamin, Aethanolamin, Propanolamin, Dimethanolamin, Diäthanolamin oder Triäthanolamin. Als organische Stickstoffbasen kommen auch quaternäre Ammoniumbasen in Betracht. Beispiele für quaternäre Ammoniumbasen sind Tetraalkylammoniumkationen, in denen die Alkylreste unabhängig voneinander geradkettige oder verzweigte C_1-C_6 -Alkylgruppen sind, wie das Tetramethylammoniumkation, das Tetraäthylammoniumkation oder das Trimethyläthylammoniumkation, sowie weiterhin das Trimethylbenzylammoniumkation, das Triäthylbenzylammoniumkation und das Trimethyl-2-hydroxyäthylammoniumkation. Besonders bevorzugt als Salzbildner sind das Ammoniumkation und Trialkylammoniumkationen, in denen die Alkylreste unabhängig voneinander geradkettige oder verzweigte, gegebenenfalls durch eine Hydroxylgruppe substituierte C_1-C_6 -Alkylgruppen, insbesondere C_1-C_2 -Alkylgruppen, sind, wie beispielsweise das Trimethylammoniumkation, das Triäthylammoniumkation und das Tri-(2-hydroxyäthylen)-ammoniumkation.

Für Y als Carbonsäureamidgruppe kommt ein entsprechender Amidrest in Betracht, welcher unsubstituiert oder am Stickstoffatom mono- oder disubstituiert sein kann oder in welchem das Stickstoffatom Bestandteil eines gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Restes ist. Als Substituenten der Amidgruppe sind beispielsweise ein gegebenenfalls substituierter und gegebenenfalls über ein Sauerstoffatom gebundener aliphatischer Rest, ein gegebenenfalls über einen aliphatischen Rest gebundener und gegebenenfalls substituierter cycloaliphatischer, aromatischer oder heterocyclischer Rest oder eine gegebenenfalls mono- oder disubstituierte Aminogruppe zu nennen.

Als Carbonsäureamidrest bevorzugt ist der Rest $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$, worin R_9 für Wasserstoff, einen gegebenenfalls substituierten Alkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Cycloalkyl-, Phenyl- oder Naphthylrest, einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest oder einen Alkoxyrest, R_{10} für Wasserstoff, Amino, mono- oder disubstituiertes Amino oder einen gegebenenfalls substituierten Alkyl-, Alkenyl-, Cycloalkyl- oder Phenylrest oder R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest stehen.

Als Substituenten der organischen Reste R_7 , R_8 , R_9 und R_{10} kommen beispielsweise Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, Alkyl, Halogenalkyl, Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, Alkylthio, Halogenalkoxy, Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, Hydroxyalkylthio, Alkoxycarbonyl, Amino, Alkylamino, Dialkylamino, Hydroxyalkylamino, Di-(hydroxyalkyl)-amino, Aminoalkylamino, Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes Phenyl, gegebenenfalls substituiertes Phenoxy oder ein gegebenenfalls substituiertes heterocyclischer Rest in Betracht.

Unter heterocyclischen Resten sind vorzugsweise 5- bis 6-gliedrige, gesättigte oder ungesättigte, gegebenenfalls substituierte monocyclische Heterocyclen mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S zu verstehen, wie beispielsweise Furan, Tetrahydrofuran, Tetrahydropyran, Tetrahydropyrimidin, Pyridin, Piperidin, Morpholin und Imidazol.

Unter Cycloalkylresten sind insbesondere solche mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen, vor allem mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, zu verstehen.

Im Substituenten Y vorliegende aliphatische, acyclische Reste können geradkettig oder verzweigt sein und enthalten zweckmässigerweise bis maximal 18 Kohlenstoffatome. Eine geringere Anzahl von Kohlenstoffatomen ist häufig, insbesondere bei zusammengesetzten Substituenten, von Vorteil.

Für Y als cyclisiertes Derivat einer Carbonsäureamidgruppe kommt insbesondere ein gegebenenfalls substituierter Oxazolin-2-yl-Rest, vorzugsweise ein unsubstituierter Oxazolin-2-yl-Rest, in Betracht.

X und Y können zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden, wobei der unsubstituierte Tetrahydrofuran-2-on-Ring bevorzugt ist, insbesondere der unsubstituierte Tetrahydrofuran-2-on-3-yl-Ring.

Als Salzbildner kommen organische und anorganische Säuren in Betracht. Beispiele organischer Säuren sind Essigsäure, Trichloressigsäure, Oxalsäure, Benzolsulfonsäure und Methansulfonsäure. Beispiele anorganischer Säuren sind Chlorwasserstoffsäure, Bromwasserstoffsäure, Jodwasserstoffsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, phosphorige Säure und Salpetersäure.

Als Metallkomplexbildner eignen sich beispielsweise Elemente der 3. und 4. Hauptgruppe, wie Aluminium, Zinn und Blei, sowie der 1. bis 8. Nebengruppe, wie beispielsweise Chrom, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Zirkon, Zink, Kupfer, Silber und Quecksilber. Bevorzugt sind die Nebengruppenelemente der 4. Periode.

Besonders geeignet zur erfindungsgemässen Verwendung sind Verbindungen der Formel I, die den nachfolgend aufgeführten Verbindungsgruppen angehören:

a) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-COOR_7$, $-COSR_8$ oder $-CONR_9R_{10}$ bedeutet, worin R_7 , R_8 und R_9 für Wasserstoff oder einen gegebenenfalls substituierten Alkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Cycloalkyl-, Phenyl- oder Naphthylrest oder einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest oder R_7 und R_8 auch für ein Kation oder R_9 auch für einen Alkoxyrest und worin R_{10} für Wasserstoff, Amino, mono- oder disubstituiertes Amino oder einen gegebenenfalls substituierten Alkyl-, Alkenyl-, Cycloalkyl- oder Phenylrest oder R_9 und

R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest stehen, oder X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze und Metallkomplexe; von Verbindungen der Gruppe a) sind diejenigen als Untergruppe a/1 hervorzuheben, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-\text{COOR}_7$, $-\text{COSR}_8$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeutet, worin

R_7 und R_8 unabhängig voneinander

- Wasserstoff oder ein Kation;
- Alkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, Alkylthio, Halogenalkoxy, Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, Hydroxyalkylthio, Alkoxycarbonyl, Dialkylamino, Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes Phenyl, gegebenenfalls substituiertes Phenoxy oder einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest substituiert ist;
- Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
- Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
- Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Alkyl oder Alkoxy substituiert ist;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, Alkyl, Alkoxy, Alkoxycarbonyl oder Halogenalkyl substituiert ist;
- Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder Alkyl substituiert ist; oder
- einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest;

R_9

- Wasserstoff;
- Alkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Cyan, Hydroxy, Amino, Alkylamino, Dialkylamino, Hydroxyalkylamino, Di-(hydro-

xyalkyl)amino, Aminoalkylamino, Alkoxy, Alkoxy-carbonyl, Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Alkyl oder Alkoxy substituiert ist, Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest substituiert ist;

- Alkoxy;
- Alkenyl;
- Cycloalkyl;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, Alkyl, Alkoxy oder Halogenalkyl substituiert ist;
- Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Nitro oder Alkyl substituiert ist; oder
- einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest; und
- R_{10} - Wasserstoff;
- Amino;
- Dialkylamino;
- Alkyl, welches unsubstituiert oder durch Hydroxy, Cyan oder Alkoxy substituiert ist;
- Alkenyl;
- Cycloalkyl; oder
- Phenyl,

oder R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest bedeuten, oder X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze und Metallkomplexe; von den Verbindungen der Gruppe a/1 sind diejenigen als Subgruppen hervorzuheben, in denen

i) R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-\text{COOR}_7$ steht, worin

- R_7
- Wasserstoff, ein Alkalimetall- oder ein quaternäres Ammoniumkation;
 - $\text{C}_1\text{-C}_{18}$ -Alkyl;
 - $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, $\text{C}_1\text{-C}_8$ -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkylthio, $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Halogenalkoxy,

C_2-C_6 -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_2-C_6 -Hydroxyalkylthio, C_1-C_4 -Alkoxy-carbonyl, C_2-C_{12} -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;

- C_1-C_6 -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
- C_3-C_{10} -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
- C_3-C_6 -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
- C_3-C_8 -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy, C_1-C_4 -Alkoxy-carbonyl oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist;
- Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl substituiert ist; oder
- einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S bedeutet,

und von diesen Verbindungen insbesondere diejenigen, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-COOR_7$ steht, worin

- R_7 - Wasserstoff, ein Alkalimetallkation oder ein quaternäres Ammoniumkation ausgewählt aus der Gruppe Ammoniumkation, Trimethyl-, Triäthyl- und Tri-(2-hydroxyäthyl)-ammoniumkation;
- C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_1-C_{10} -Alkyl, welches durch 1 oder 2 Hydroxygruppen substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch 1 bis 3 Chlor- oder Bromatome, eine Nitrogruppe, eine Cyanogruppe, eine C_1-C_4 -Alkoxygruppe, eine C_2-C_8 -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome

unterbrochen ist, eine Hydroxy- C_1-C_4 -Alkoxygruppe, eine Hydroxy- C_2-C_6 -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine C_1-C_4 -Alkoxy-carbonylgruppe, eine Di- $(C_1-C_4$ -Alkyl)-aminogruppe, einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor oder Methoxy substituiert ist, einen Cyclohexylrest, einen Furan-, Tetrahydrofuran-, Tetrahydropyran-, Pyridino-, Piperidino- oder Morpholinorest substituiert ist;

- C_3-C_{10} -Alkenyl;
- C_2-C_4 -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;
- Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituiert ist;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 bis 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, C_1-C_4 -Alkyl oder Methoxy substituiert ist;
- Naphthyl; oder
- Pyridin

bedeutet;

ii) $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-COSR_8$ steht, worin

- R_8
- Wasserstoff;
 - C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_1-C_{10} -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, C_1-C_8 -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_1-C_4 -Alkylthio, C_2-C_6 -Halogenalkoxy, C_2-C_6 -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_2-C_6 -Hydroxyalkylthio, C_1-C_4 -Alkoxy-carbonyl, C_2-C_{12} -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;
 - C_1-C_6 -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis

3 Heteroatomen substituiert ist;

- C_3-C_{10} -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
- C_3-C_6 -Alkinyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
- C_3-C_8 -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist;
- Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl substituiert ist; oder
- einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S bedeutet,

und von diesen Verbindungen insbesondere diejenigen, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-COSR_8$ steht, worin

- R_8
- C_1-C_{12} -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine C_1-C_4 -Alkoxycarbonylgruppe substituiert ist; oder
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch ein Chloratom substituiert ist,

bedeutet;

iii) R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-CONR_9R_{10}$ steht, worin

- R_9
- Wasserstoff;
 - C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_2-C_8 -Alkyl, welches durch Amino substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkyl, welches durch Halogen, Hydroxy, C_1-C_6 -Alkylamino, C_2-C_8 -Dialkylamino, C_2-C_6 -Hydroxyalkylamino, C_2-C_6 -Di-(hydroxyalkyl)-amino, C_2-C_6 -Aminoalkylamino oder C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl substituiert ist;

- C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Cyan, C_1-C_4 -Alkoxy, Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S substituiert ist;
 - C_1-C_3 -Alkoxy;
 - C_3-C_6 -Alkenyl;
 - C_3-C_8 -Cycloalkyl;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist; oder
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Nitro oder Methyl substituiert ist; und
- R_{10}
- Wasserstoff;
 - Amino;
 - C_2-C_4 -Dialkylamino;
 - C_1-C_6 -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Hydroxy oder Cyan substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkoxyalkyl;
 - C_3-C_6 -Alkenyl;
 - C_3-C_6 -Cycloalkyl; oder
 - Phenyl;

oder worin R_9 und R_{10} zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten, heterocyclischen Ring, welcher noch 1 oder 2 weitere Heteroatome aus der Gruppe N, O und S enthalten kann, bedeuten,

und von diesen Verbindungen insbesondere diejenigen, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-CONR_9R_{10}$ steht, worin

- R_9
- Wasserstoff;
 - C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_2-C_8 -Alkyl, welches durch eine Aminogruppe substituiert ist;

- C_2-C_6 -Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;
 - C_2-C_4 -Alkyl, welches durch ein Chlor- oder Bromatom, eine C_1-C_4 -Alkylaminogruppe, eine Di- $(C_1-C_4$ -Alkyl)-aminogruppe, eine C_1-C_4 -Hydroxyalkylaminogruppe, eine Di- $(C_1-C_3$ -Hydroxyalkyl)-aminogruppe, eine C_1-C_4 -Alkoxygruppe oder eine C_1-C_4 -Alkoxy-carbonylgruppe substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine Cyanogruppe, oder einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor substituiert ist, einen Furanyl-, Tetrahydrofuranyl-, Piperidino- oder Morpholinorest substituiert ist;
 - C_1-C_3 -Alkoxy;
 - C_2-C_4 -Alkenyl;
 - Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch eine Methylgruppe substituiert ist; oder
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, Cyano, Methyl, Aethyl, Methoxy und Trifluormethyl substituiert ist,
- R_{10}
- Wasserstoff;
 - C_1-C_6 -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe oder eine Cyano-
gruppe substituiert ist;
 - C_2-C_4 -Alkoxyalkyl;
 - C_2-C_4 -Alkenyl;
 - Cycloheyl; oder
 - Phenyl, oder

R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom an das sie gebunden sind, einen unsubstituierten oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituierten Piperidino-, Tetrahydropyrimidino-, Morpholino- oder Imidazolylrest bedeuten;

iv) $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest steht,

und von diesen Verbindungen insbesondere diejenigen, in denen $R_1, R_2,$

R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für einen unsubstituierten Oxazolin-2-yl-Rest steht; und

v) R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden,

und von diesen Verbindungen insbesondere diejenigen, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X und Y zusammen einen unsubstituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring, vor allem einen unsubstituierten Tetrahydrofuran-2-on-3-yl-Ring bilden;

b) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X für $-\text{CH}_2-$ steht;

c) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X für $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ steht;

d) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X für $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ steht;

e) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X für $-\text{CH}(\text{A})-\text{CH}(\text{E})-$, worin eines der Symbole A und E Wasserstoff und das andere eine Methylgruppe bedeutet, steht;

f) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X für $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ steht;

g) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X für $-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-$ steht;

h) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X für $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ steht;

i) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 , R_2 und R_3 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl und R_4 , R_5 und R_6 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C_1-C_3 -Alkyl bedeuten und X und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben;

k) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 Wasserstoff oder Halogen, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff, Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl, R_4 Wasserstoff, R_5 Wasserstoff und R_6 Wasserstoff oder C_1-C_3 -Alkyl bedeuten

und X und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben;

l) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 Wasserstoff, Chlor, Jod oder Brom, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff, Chlor, Jod, Brom, Nitro, Methyl oder Aethyl, R_4 Wasserstoff, R_5 Wasserstoff und R_6 Wasserstoff oder Methyl bedeuten und X und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben;

m) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 , R_2 und R_3 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl und R_4 , R_5 und R_6 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C_1-C_3 -Alkyl bedeuten, X die für Formel I angegebene Bedeutung hat und Y für einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-COOR_7$, $-COSR_8$ oder $-CONR_9R_{10}$ steht, worin

- R_7
- Wasserstoff, ein Alkalimetall- oder ein quaternäres Ammoniumkation;
 - C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_1-C_{10} -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, C_1-C_8 -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_1-C_4 -Alkylthio, C_2-C_6 -Halogenalkoxy, C_2-C_6 -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_2-C_6 -Hydroxyalkylthio, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl, C_2-C_{12} -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;
 - C_1-C_6 -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
 - C_3-C_{10} -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
 - C_3-C_6 -Alkinyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
 - C_3-C_8 -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist;

- Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl substituiert ist; oder
 - einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S,
- R_8
- Wasserstoff;
 - C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_1-C_{10} -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, C_1-C_8 -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_1-C_4 -Alkylthio, C_2-C_6 -Halogenalkoxy, C_2-C_6 -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_2-C_6 -Hydroxyalkylthio, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl, C_2-C_{12} -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;
 - C_1-C_6 -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
 - C_3-C_{10} -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
 - C_3-C_6 -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
 - C_3-C_8 -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist;
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl substituiert ist; oder
 - einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S,

 R_9

- Wasserstoff;

- C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_2-C_8 -Alkyl, welches durch Amino substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkyl, welches durch Halogen, Hydroxy, C_1-C_6 -Alkylamino, C_2-C_8 -Dialkylamino, C_2-C_6 -Hydroxyalkylamino, C_2-C_6 -Di-(hydroxyalkyl)-amino, C_2-C_6 -Aminoalkylamino oder C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Cyan, C_1-C_4 -Alkoxy, Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S substituiert ist;
 - C_1-C_3 -Alkoxy;
 - C_3-C_6 -Alkenyl;
 - C_3-C_8 -Cycloalkyl;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist; oder
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Nitro oder Methyl substituiert ist; und
- R_{10}
- Wasserstoff;
 - Amino;
 - C_2-C_4 -Dialkylamino;
 - C_1-C_6 -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Hydroxy oder Cyan substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkoxyalkyl;
 - C_3-C_6 -Alkenyl;
 - C_3-C_6 -Cycloalkyl; oder
 - Phenyl;

oder worin R_9 und R_{10} zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten, heterocyclischen Ring, welcher noch 1 oder 2 weitere Heteroatome aus der Gruppe N, O und S enthalten kann, bedeuten; oder X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden;

n) Verbindungen der Formel I, in denen R_1 Wasserstoff, Chlor, Jod oder Brom, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff, Chlor, Jod, Brom, Nitro, Methyl oder Aethyl, R_4 Wasserstoff, R_5 Wasserstoff und R_6 Wasserstoff oder Methyl bedeuten, X die für Formel I angegebene Bedeutung hat und Y für einen unsubstituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-\text{COOR}_7$, $-\text{COSR}_8$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ steht, worin

R_7 - Wasserstoff, ein Alkalimetallkation oder ein quaternäres Ammoniumkation ausgewählt aus der Gruppe Ammoniumkation, Trimethyl-, Triäthyl- und Tri-(2-hydroxyäthyl)-ammoniumkation;

- $\text{C}_1\text{-C}_{18}$ -Alkyl;

- $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl, welches durch 1 oder 2 Hydroxygruppen substituiert ist;

- $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl, welches durch 1 bis 3 Chlor- oder Bromatome, eine Nitrogruppe, eine Cyanogruppe, eine $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxygruppe, eine $\text{C}_2\text{-C}_8$ -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine Hydroxy- $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxygruppe, eine Hydroxy- $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxycarbonylgruppe, eine Di- $(\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl})$ -aminogruppe, einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor oder Methoxy substituiert ist, einen Cyclohexylrest, einen Furan-, Tetrahydrofuran-, Tetrahydropyran-, Pyridino-, Piperidino- oder Morpholinorest substituiert ist;

- $\text{C}_3\text{-C}_{10}$ -Alkenyl;

- $\text{C}_2\text{-C}_4$ -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;

- Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituiert ist;

- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 bis 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl oder Methoxy substituiert ist;

- Naphthyl; oder

- Pyridin,

R_8 - $\text{C}_1\text{-C}_{12}$ -Alkyl;

- $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl, welches durch eine $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxycarbonylgruppe substituiert ist;

- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch ein Chloratom substituiert ist,
- R₉ - Wasserstoff;
- C₁-C₁₈-Alkyl;
- C₂-C₈-Alkyl, welches durch eine Aminogruppe substituiert ist;
- C₂-C₆-Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;
- C₂-C₄-Alkyl, welches durch ein Chlor- oder Bromatom, eine C₁-C₄-Alkylaminogruppe, eine Di-(C₁-C₄-Alkyl)-aminogruppe, eine C₁-C₄-Hydroxyalkylaminogruppe, eine Di-(C₁-C₃-Hydroxyalkyl)-aminogruppe, eine C₁-C₄-Alkoxygruppe oder eine C₁-C₄-Alkoxy-carbonylgruppe substituiert ist;
- C₁-C₄-Alkyl, welches durch eine Cyanogruppe, oder einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor substituiert ist, einen Furanyl-, Tetrahydrofuran-, Piperidino- oder Morpholino-rest substituiert ist;
- C₁-C₃-Alkoxy;
- C₂-C₄-Alkenyl;
- Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch eine Methylgruppe substituiert ist;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, Cyano, Methyl, Aethyl, Methoxy und Trifluormethyl substituiert ist, und
- R₁₀ - Wasserstoff;
- C₁-C₆-Alkyl;
- C₁-C₄-Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe oder eine Cyanogruppe substituiert ist;
- C₂-C₄-Alkoxyalkyl;
- C₂-C₄-Alkenyl;
- Cyclohexyl; oder
- Phenyl, oder

R₉ und R₁₀ gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen unsubstituierten oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituierten Piperidino-, Tetrahydropyrimidino-, Morpholino- oder Imidazolylrest bedeuten, oder X und Y zusammen einen unsubstituierten Tetrahydrofuran-2-on-3-yl-Ring bilden;

- o) Verbindungen der vorstehend genannten Gruppe m), in denen X für $-\text{CH}_2-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig R_1 Wasserstoff, Chlor, Brom oder Jod, R_2 Wasserstoff, Nitro oder Methyl, R_3 Wasserstoff, Chlor, Brom, Nitro, Methyl oder Aethyl, R_4 und R_5 Wasserstoff, R_6 Wasserstoff oder Methyl bedeuten und Y für $-\text{COOR}_7$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ steht,
- i) R_7 nicht Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Diäthylamino substituiertes C_1-C_4 -Alkyl bedeutet, und
 - ii) R_9 nicht für Wasserstoff, C_1-C_4 -Alkyl, Allyl, unsubstituiertes oder p-Chlor-substituiertes Phenyl steht, wenn R_{10} Wasserstoff, Amino, C_1-C_4 -Alkyl, Allyl oder Phenyl bedeutet, und
 - iii) R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, nicht einen Morpholinring bilden;
- p) Verbindungen der vorstehend genannten Gruppe n), in denen X für $-\text{CH}_2-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig R_1 Wasserstoff, Chlor, Jod oder Brom, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff, Chlor, Brom, Nitro, Methyl oder Aethyl, R_4 und R_5 Wasserstoff, R_6 Wasserstoff oder Methyl und Y $-\text{COOR}_7$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeuten,
- i) R_7 nicht Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Diäthylamino substituiertes C_1-C_4 -Alkyl bedeutet und
 - ii) R_9 nicht für Wasserstoff, C_1-C_4 -Alkyl, Allyl, unsubstituiertes oder p-Chlor-substituiertes Phenyl steht, wenn R_{10} Wasserstoff, C_1-C_4 -Alkyl, Allyl oder Phenyl bedeutet und
 - iii) R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, nicht einen Morpholinring bilden;
- q) Verbindungen der vorstehend genannten Gruppe m), in denen X für $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4, \text{R}_5$ und R_6 Wasserstoff und Y $-\text{COOR}_7$ bedeuten, R_7 nicht Wasserstoff ist;
- r) Verbindungen der vorstehend genannten Gruppe n), in denen X für $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4, \text{R}_5$ und R_6 Wasserstoff und Y $-\text{COOR}_7$ bedeuten, R_7 nicht Wasserstoff ist;

s) Verbindungen der vorgenannten Gruppe m), in denen

X für $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn R_1 Wasserstoff oder Chlor, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff oder Chlor, R_4 und R_5 Wasserstoff, R_6 Wasserstoff oder Methyl und Y $-\text{COOR}_7$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeuten,

i) R_7 nicht für Aethoxy steht und

ii) R_9 nicht für Wasserstoff, Aethyl, sek.-Butyl oder Allyl steht, wenn R_{10} Wasserstoff, Aethyl, sek.-Butyl oder Allyl bedeutet und

iii) R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, nicht einen Pyrrolidinoring bilden;

t) Verbindungen der vorgenannten Gruppe n), in denen

X für $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig R_1 Wasserstoff oder Chlor, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff oder Chlor, R_4 und R_5 Wasserstoff, R_6 Wasserstoff oder Methyl und Y $-\text{COOR}_7$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeuten,

i) R_7 nicht für Aethyl steht und

ii) R_9 nicht für Wasserstoff, Aethyl, sek.-Butyl oder Allyl steht, wenn R_{10} Wasserstoff, Aethyl, sek.-Butyl oder Allyl bedeutet;

u) Verbindungen der vorgenannten Gruppe m), in denen

X für $-\text{CH}(\text{A})-\text{CH}(\text{E})-$ steht, worin eines der Symbole A und E Wasserstoff und das andere eine Methylgruppe bedeutet;

v) Verbindungen der vorgenannten Gruppe n), in denen

X für $-\text{CH}(\text{A})-\text{CH}(\text{E})-$ steht, worin eines der Symbole A und E Wasserstoff und das andere eine Methylgruppe bedeutet;

w) Verbindungen der vorgenannten Gruppe m), in denen

X für $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4, \text{R}_5$ und R_6 Wasserstoff und Y $-\text{COOR}_7$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeuten, R_7 nicht für Wasserstoff, Methyl oder Aethyl und R_9 und R_{10} nicht beide für Aethyl stehen;

x) Verbindungen der vorgenannten Gruppe n), in denen X für $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4, \text{R}_5$ und R_6 Wasserstoff und Y $-\text{COOR}_7$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeuten, R_7 nicht Wasserstoff, Methyl oder Aethyl und R_9 und R_{10} nicht beide Aethyl bedeuten;

y) Verbindungen der vorgenannten Gruppe m), in denen X für $-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-$ steht;

z) Verbindungen der vorgenannten Gruppe n), in denen X für $-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-$ steht;

z¹) Verbindungen der vorgenannten Gruppe m), in denen X für $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ steht;

z²) Verbindungen der vorgenannten Gruppe n), in denen X für $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ steht;

z³) Verbindungen der vorgenannten Gruppe m), in denen X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden;

z⁴) Verbindungen der vorgenannten Gruppe n), in denen X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden.

Die Chinolinderivate der Formel I besitzen in hervorragendem Masse die Eigenschaft, Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Agrarchemikalien zu schützen. Als Agrarchemikalien kommen beispielsweise Defoliationsmittel, Desiccationsmittel, Mittel zum Schutz gegen Frostschäden und Pflanzenschutzmittel, wie beispielsweise Insektizide, Fungizide, Bakterizide, Nematizide und insbesondere Herbizide in Betracht. Die Agrarchemikalien können verschiedenen Stoffklassen angehören. Herbizide können beispielsweise zu einer der folgenden Stoffklassen gehören:

Triazine und Triazinone; Harnstoffe wie beispielsweise 1-(Benzthiazol-2-yl)-1,3-dimethylharnstoff ("Methabenzthiazuron") oder insbesondere Phenylharnstoffe, vor allem 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylharnstoff ("Isoproturon"), oder Sulfonylharnstoffe; Carbamate und Thiocarbamate; Halogenacetanilide, insbesondere Chloracetanilide; Chloracetamide; Halogenphenoxyessigsäureester; Diphenyläther, wie beispielsweise substituierte Phenoxyphenoxyessigsäureester und -amide und substituierte Phenoxyphenoxypropionsäureester und -amide; substituierte Pyridyloxyphenoxyessigsäureester und -amide und substituierte Pyridyloxyphenoxypropionsäureester und -amide, insbesondere 2-[4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy]-propionsäure-2-propinylester und 2-[4-(5-

Trifluormethylpyridyl-2-oxy)-phenoxy]-propionsäure-n-butylester; Benzoessäurederivate; Nitroaniline; Oxadiazolone; Phosphate; und Pyrazole.

Im einzelnen kommen beispielsweise folgende Substanzen in Betracht:

Triazine und Triazinone: 2,4-Bis(isopropylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazin ("Prometryn"), 2,4-bis(äthylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazin ("Simetryn"), 2-(1',2'-Dimethylpropylamino)-4-äthylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin ("Dimethametryn"), 4-Amino-6-tert.butyl-4,5-dihydro-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-on ("Metribuzin"), 2-Chlor-4-äthylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin ("Atrazin"), 2-Chlor-4,6-bis(äthylamino)-1,3,5-triazin ("Simazin"), 2-tert. Butylamino-4-chlor-6-äthylamino-1,3,5-triazin ("Terbuthylazin"), 2-tert. Butylamino-4-äthylamino-6-methoxy-1,3,5-triazin ("Terbumeton"), 2-tert. Butylamino-4-äthylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin ("Terbutryn"), 2-Aethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin ("Ametryn");

Harnstoffe: 1-(Benzothiazol-2-yl)-1,3-dimethylharnstoff; Phenylharnstoffe wie beispielsweise 3-(3-Chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylharnstoff ("Chlortoluron"), 1,1-Dimethyl-3-(aaa-trifluor-m-tolyl)-harnstoff ("Fluometuron"), 3-(4-Brom-3-chlorphenyl)-1-methoxy-1-methylharnstoff ("Chlorbromuron"), 3-(4-Bromphenyl)-1-methoxy-1-methylharnstoff ("Metobromuron"), 3-(3,4-Dichlorphenyl)-1-methoxy-1-methylharnstoff ("Linuron"), 3-(4-Chlorphenyl)-1-methoxy-1-methylharnstoff ("Monolinuron"), 3-(3,4-Dichlorphenyl)-1,1-dimethylharnstoff ("Diuron"), 3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethylharnstoff ("Monuron"), 3-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylharnstoff ("Metoxuron"); Sulfonylharnstoffe wie beispielsweise N-(2-Chlorphenylsulfonyl)-N'-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-harnstoff, N-(2-Methoxycarbonylphenylsulfonyl)-N'-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-harnstoff, N-(2,5-Dichlorphenylsulfonyl)-N'-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-harnstoff, N-[2-(2-butenyloxy)-phenylsulfonyl]-N'-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-harnstoff sowie

die in den europäischen Patentpublikationen 44808 und 44809 genannten Sulfonylharnstoffe;

Carbamate und Thiocarbamate: N-(3',4'-Dichlorphenyl)-propionanilid ("Propanil"), S-4-Chlorbenzyl-diäthyl-thiocarbamat ("Benthiocarb"), S-Aethyl-N,N-hexamethylen-thiocarbamat ("Molinate"), S-Aethyl-di-propyl-thiocarbamat ("EPTC"), N,N-di-sec. Butyl-S-benzyl-thiocarbamat, S-(2,3-Dichlorallyl)-di-isopropyl-thiocarbamat ("Di-allate"), 1-(Propylthiocarbonyl)-decahydro-chinaldin, S-Aethyl-di-isobutyl-thiocarbamat ("Butylate");

Chloracetanilide: 2-Chlor-2',6'-diäthyl-N-(2"-n-propoxyäthyl)-acetanilid ("Propalochlor"), 2-Chlor-6'-äthyl-N-(2"-methoxy-1"-methyläthyl)-acet-o-toluidid ("Metolachlor"), 2-Chlor-2',6'-diäthyl-N-(butoxymethyl)acetanilid ("Butachlor"), 2-Chlor-6'-äthyl-N-(äthoxymethyl)acet-o-toluidid ("Acetochlor"), 2-Chlor-6'-äthyl-N-(2"-propoxy-1"-methyläthyl)acet-o-toluidid, 2-Chlor-2',6'-dimethyl-N-(2"-methoxy-1"-methyläthyl)acetanilid, 2-Chlor-2',6'-dimethyl-N-(2"-methoxyäthyl)acetanilid ("Dimethachlor"), 2-Chlor-2',6'-diäthyl-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetanilid, 2-Chlor-6'-äthyl-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-o-toluidid, 2-Chlor-6'-äthyl-N-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)acet-o-toluidid, 2-Chlor-6'-äthyl-N-(2"-butoxy-1"-methyläthyl)acet-o-toluidid ("Metazolachlor"), 2-Chlor-6'-äthyl-N-(2"-butoxyl-1"-(methyläthyl)acet-o-toluidid und 2-Chlor-2'-trimethylsilyl-N-(butoxymethyl)-acetanilid;

Chloracetamide: N-[1-Isopropyl-2-methylpropen-1-yl-(1)]-N-(2'-methoxyäthyl)-chloracetamid;

Diphenyläther und Nitrodiphenyläther: 2,4-Dichlorphenyl-4'-nitrophenyläther ("Nitrofen"), 2-Chlor-1-(3'-äthoxy-4'-nitrophenoxy)-4-trifluormethyl-benzol ("Oxyfluorfen"), 2',4'-Dichlorphenyl-3-methoxy-4-nitrophenyl-äther ("Chlormethoxynil"), 2-[4'-(2",4"-Dichlorphenoxy)-phenoxy]propionsäure-methylester, N-(2'-Phenoxyäthyl)-2-[5' (2"-chlor-4"-trifluormethylphenoxy)-phenoxy]-propionsäureamid, 2-[2-Nitro-5-(2-chlor-4-trifluormethylphenoxy)-phenoxy]-propionsäure-2-methoxyäthyl-

ester, 2-Chlor-4-trifluormethylphenyl-3'-oxazolin-2'-yl-4'-nitrophenyl-äther;

Benzoessäurederivate: Methyl-5-(2',4'-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat ("Bifenox"), 5-(2'-Chlor-4'-trifluormethylphenoxy)-2-nitrobenzoesäure ("Acifluorfen"), 2,6-Dichlorbenzonitril ("Dichlobenil");

Nitroaniline: 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluormethylanilin ("Trifluralin"), N-(1'-Äthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin ("Pendimethalin");


Oxadiazolone: 5-tert.-Butyl-3-(2',4'-dichlor-5'-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-on ("Oxadiazon");

Phosphate: S-2-Methylpiperidino-carbonylmethyl-O,0-dipropyl-phosphorodithioat ("Piperophos");

Pyrazole: 1,3-Dimethyl-4-(2',4'-dichlorbenzoyl)-5-(4'-tolylsulfonyloxy)-pyrazol;

2-[1-(Äthoxyimino)-butyl]-5-[2-(Äthylthio)-propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-on und das Natriumsalz von 2-[1-(N-Allyloxyamino)-butyliden]-5,5-dimethyl-4-methoxycarbonyl-cyclohexan-1,3-dion.

Besonders geeignet sind die Verbindungen der Formel I zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Herbiziden der Formel A




worin

X''_1 Wasserstoff oder Halogen,

X''_2 Wasserstoff, Halogen oder Trifluormethyl,

Q das Fragment =N- oder =CH-,

R" C₁-C₄-Alkyl, welches unsubstituiert oder durch C₁-C₄-Alkoxy substituiert ist, C₃-C₄-Alkenyl, C₃-C₄-Alkynyl oder



R₁₃ C₁-C₄-Alkyl, R₁₄ C₁-C₄-Alkyl oder R₁₃ und R₁₄ gemeinsam C₁-C₅-Alkylen bedeuten.

Als Kulturpflanzen, welche durch Chinolinderivate der Formel I gegen Agrarchemikalien geschützt werden können, kommen insbesondere diejenigen in Betracht, die auf dem Nahrungs- oder Textilsektor von Bedeutung sind, wie beispielsweise Kulturhirse, Reis, Mais, Getreidearten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer), Baumwolle, Zuckerrüben, Zuckerrohr und Soja.

Besonders erwähnenswert ist die Schutzwirkung von Verbindungen der Formel I bei Getreide gegen schädigende Wirkungen von Herbiziden, wie Diphenyläthern und substituierten Pyridyloxyphenoxypropionsäureestern, insbesondere 2-[4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy]-propionsäure-2-propinylester.

Ein geeignetes Verfahren zum Schützen von Kulturpflanzen unter Verwendung von Verbindungen der Formel I besteht darin, dass man Kulturpflanzen, Teile dieser Pflanzen oder für den Anbau der Kulturpflanzen bestimmte Böden vor oder nach dem Einbringen des pflanzlichen Materials in den Boden mit einer Verbindung der Formel I oder einem Mittel, welches eine solche Verbindung enthält, behandelt. Die Behandlung kann vor, gleichzeitig mit oder nach dem Einsatz der Agrarchemikalie erfolgen. Als Pflanzenteile kommen insbesondere diejenigen in Betracht, die zur Neubildung einer Pflanze befähigt sind, wie beispielsweise Samen, Früchte, Stengelteile und Zweige (Stecklinge) sowie auch Wurzeln, Knollen und Rhizome.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur selektiven Bekämpfung von Unkräutern in Kulturpflanzenbeständen, wobei die Kulturpflanzenbestände, Teile der Kulturpflanzen oder Anbauflächen für Kulturpflanzen mit einem Herbizid und einer Verbindung der Formel I

oder einem Mittel, welches diese Kombination enthält, behandelt. Die die Herbizid/Antidot-Kombination enthaltenden Mittel bilden ebenfalls einen Bestandteil der vorliegenden Erfindung.

Bei den zu bekämpfenden Unkräutern kann es sich sowohl um monokotyle wie um dikotyle Unkräuter handeln.

Als Kulturpflanzen oder Teile dieser Pflanzen kommen beispielsweise die vorstehend genannten in Betracht. Als Anbauflächen gelten die bereits mit Kulturpflanzen bewachsenen oder die ausgesäten Bodenareale, wie auch die zur Bebauung mit Kulturpflanzen bestimmten Böden.

Die zu applizierende Aufwandmenge Antidot im Verhältnis zur Agrarchemikalie richtet sich weitgehend nach der Anwendungsart. Bei einer Feldbehandlung, welche entweder unter Verwendung einer Tankmischung oder durch getrennte Applikation von Agrarchemikalie und Antidot durchgeführt wird, liegt in der Regel ein Verhältnis von Antidot zu Agrarchemikalie von 1:100 bis 10:1, bevorzugt 1:5 bis 8:1, und insbesondere 1:1, vor.

Dagegen werden bei der Samenbeizung und ähnlichen Einsatzmethoden weit geringere Mengen Antidot im Verhältnis zur Aufwandmenge an Agrarchemikalie/ha Anbaufläche benötigt. Bei der Samenbeizung werden in der Regel 0,1 bis 10 g Antidot/kg Samen, bevorzugt 1 bis 2 g, appliziert. Wird das Gegenmittel kurz vor der Aussaat unter Samenquellung appliziert, so werden zweckmässigerweise Antidot-Lösungen verwendet, welche den Wirkstoff in einer Konzentration von 1 bis 10 000 ppm, bevorzugt 100 bis 1000 ppm, enthalten.

Die Verbindungen der Formel I können für sich allein oder zusammen mit inerten Zusatzstoffen und/oder den zu antagonisierenden Agrarchemikalien zur Anwendung gelangen.

Die vorliegende Anmeldung betrifft daher auch Mittel, welche Verbindungen der Formel I und inerte Zusatzstoffe und/oder zu antagonisierende Agrarchemikalien, insbesondere Pflanzenschutzmittel und vor allem Herbizide, enthalten.

Zur Applikation als Antidot oder Wuchsregulator werden die Verbindungen der Formel I oder Kombinationen von Verbindungen der Formel I mit zu antagonisierenden Agrarchemikalien zweckmässigerweise zusammen mit den in der Formulierungstechnik üblichen Hilfsmitteln eingesetzt und werden daher z.B. zu Emulsionskonzentraten, streichfähigen Pasten, direkt versprühbaren oder verdünnbaren Lösungen, verdünnten Emulsionen, Spritzpulvern, löslichen Pulvern, Stäubemitteln, Granulaten, auch Verkapselungen in z.B. polymeren Stoffen in bekannter Weise verarbeitet. Die Anwendungsv erfahren wie Versprühen, Vernebeln, Verstäuben, Verstreuen, Bestreichen oder Giessen werden gleich wie die Art der Mittel den angestrebten Zielen und den gegebenen Verhältnissen entsprechend gewählt.

Die Formulierungen, d.h., die den Wirkstoff der Formel I oder eine Kombination von Wirkstoff der Formel I mit zu antagonisierender Agrarchemikalie und gegebenenfalls einen festen oder flüssigen Zusatzstoff enthaltenden Mittel, Zubereitungen oder Zusammensetzungen werden in bekannter Weise hergestellt, z.B. durch inniges Vermischen und/oder Vermahlen der Wirkstoffe mit Streckmitteln, wie z.B. mit Lösungsmitteln, festen Trägerstoffen, und gegebenenfalls oberflächenaktiven Verbindungen (Tensiden).

Als Lösungsmittel können in Frage kommen: Aromatische Kohlenwasserstoffe, bevorzugt die Fraktionen C_8 bis C_{12} , wie z.B. Xylolgemische oder substituierte Naphthaline, Phthalsäureester wie Dibutyl- oder Dioctylphthalat, aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Cyclohexan oder Paraffine, Alkohole und Glykole sowie deren Aether und Ester, wie Aethanol, Aethylenglykol, Aethylenglykolmonomethyl- oder -äthyläther, Ketone wie Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel wie N-Methyl-2-pyrrolidon, Dimethylsulfoxid oder Dimethylformamid, sowie gegebenenfalls epoxydierte Pflanzenöle wie epoxydiertes Kokosnussöl oder Sojaöl; oder Wasser.

Als feste Trägerstoffe, z.B. für Stäubemittel und dispergierbare Pulver, werden in der Regel natürliche Gesteinsmehle verwendet, wie Calcit, Talkum, Kaolin, Montmorillonit oder Attapulgit. Zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften können auch hochdisperse Kieselsäure oder hochdisperse saugfähige Polymerisate zugesetzt werden. Als gekörnte, adsorptive Granulatträger kommen poröse Typen wie z.B. Bimsstein, Ziegelbruch, Sepiolit oder Bentonit, als nicht sorptive Trägermaterialien z.B. Calcit oder Sand in Frage. Darüberhinaus kann eine Vielzahl von vorgranulierten Materialien anorganischer oder organischer Natur wie insbesondere Dolomit oder zerkleinerte Pflanzentrückstände verwendet werden.

Als oberflächenaktive Verbindungen kommen je nach Art des zu formulierenden Wirkstoffs der Formel I und gegebenenfalls auch der zu antagonisierenden Agrarchemikalie nichtionogene, kation- und/oder anionaktive Tenside mit guten Emulgier-, Dispergier- und Netzeigenschaften in Betracht. Unter Tensiden sind auch Tensidgemische zu verstehen.

Geeignete anionische Tenside können sowohl sog. wasserlösliche Seifen wie wasserlösliche synthetische oberflächenaktive Verbindungen sein.

Als Seifen seien die Alkali-, Erdalkali- oder gegebenenfalls substituierten Ammoniumsalze von höheren Fettsäuren (C_{10} - C_{22}), wie z.B. die Na- oder K-Salze der Oel- oder Stearinsäure, oder von natürlichen Fettsäuregemischen, die z.B. aus Kokosnuss- oder Talgöl gewonnen werden können, genannt. Ferner sind auch die Fettsäure-methyllaurinsalze zu erwähnen.

Häufiger werden jedoch sog. synthetische Tenside verwendet, insbesondere Fettsulfonate, Fettsulfate, sulfonierte Benzimidazolderivate oder Alkylarylsulfonate.

Die Fettsulfonate oder -sulfate liegen in der Regel als Alkali-, Erdalkali- oder gegebenenfalls substituierte Ammoniumsalze vor und weisen einen Alkylrest mit 8 bis 22 C-Atomen auf, wobei Alkyl auch den Alkylteil von Acylresten einschließt, z.B. das Na- oder Ca-Salz der Ligninsulfonsäure, des Dodecylschwefelsäureesters oder eines aus

natürlichen Fettsäuren hergestellten Fettalkoholsulfatgemisches. Hierher gehören auch die Salze der Schwefelsäureester und Sulfonsäuren von Fettalkohol-Aethylenoxyd-Addukten. Die sulfonierten Benzimidazol-derivate enthalten vorzugsweise 2-Sulfonsäuregruppen und einen Fettsäurerest mit 8 bis 22 C-Atomen. Alkylarylsulfonate sind z.B. die Na-, Ca- oder Triäthanolaminsalze der Dodecylbenzolsulfonsäure, der Dibutyl-naphthalinsulfonsäure, oder eines Naphthalinsulfonsäure-Formaldehydkondensationsproduktes.

Ferner kommen auch entsprechende Phosphate wie z.B. Salze des Phosphorsäureesters eines p-Nonylphenol-(4-14)-Aethylenoxyd-Adduktes oder Phospholipide in Frage.

Als nichtionische Tenside kommen in erster Linie Polyglykoläther-derivate von aliphatischen oder cycloaliphatischen Alkoholen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren und Alkylphenolen in Frage, die 3 bis 30 Glykoläthergruppen und 8 bis 20 Kohlenstoffatome im (aliphatischen) Kohlenwasserstoffrest und 6 bis 18 Kohlenstoffatome im Alkylrest der Alkylphenole enthalten können.

Weitere geeignete nichtionische Tenside sind die wasserlöslichen, 20 bis 250 Aethylenglykoläthergruppen und 10 bis 100 Propylenglykoläthergruppen enthaltenden Polyäthylenoxidaddukte an Polypropylenglykol, Aethyldiaminopolypropylenglykol und Alkylpolypropylenglykol mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen in der Alkylkette. Die genannten Verbindungen enthalten üblicherweise pro Propylenglykol-Einheit 1 bis 5 Aethylenglykoleinheiten.

Als Beispiele nichtionischer Tenside seien Nonylphenolpolyäthoxyäthanoole, Ricinusölpolyglykoläther, Polypropylen-Polyäthylenoxydaddukte, Tributylphenoxypolyäthoxyäthanol, Polyäthylenglykol und Octylphenoxypolyäthoxyäthanol erwähnt.

Ferner kommen auch Fettsäureester von Polyoxyäthylensorbitan wie das Polyoxyäthylensorbitan-trioleat in Betracht.

Bei den kationischen Tensiden handelt es sich vor allem um quartäre Ammoniumsalze, welche als N-Substituenten mindestens einen Alkylrest mit 8 bis 22 C-Atomen enthalten und als weitere Substituenten niedrige, gegebenenfalls halogenierte Alkyl-, Benzyl- oder niedrige Hydroxyalkylreste aufweisen. Die Salze liegen vorzugsweise als Halogenide, Methylsulfate oder Äthylsulfate vor, z.B. das Stearyltrimethylammoniumchlorid oder das Benzyl-di(2-chloräthyl)äthylammoniumbromid.

Die in der Formulierungstechnik gebräuchlichen Tenside sind u.a. in folgenden Publikationen beschrieben:

"Mc Cutcheon's Detergents and Emulsifiers Annual" MC
Publishing Corp., Ringwood New Jersey, 1980
Sisely and Wood, "Encyclopedia of Surface Active Agents",
Chemical Publishing Co., Inc. New York, 1980

Die agrochemischen Zubereitungen enthalten in der Regel 0,1 bis 99 %, insbesondere 0,1 bis 95 %, Wirkstoff der Formel I, 99,9 bis 1 % insbesondere 99,8 bis 5 % eines festen oder flüssigen Zusatzstoffes und 0 bis 25 %, insbesondere 0,1 bis 25 % eines Tensides.

Während als Handelsware eher konzentrierte Mittel bevorzugt werden, verwendet der Endverbraucher in der Regel verdünnte Mittel.

Die Mittel können auch weitere Zusätze wie Stabilisatoren, Entschäumer, Viskositätsregulatoren, Bindemittel, Haftmittel sowie Dünger oder andere Wirkstoffe zur Erzielung spezieller Effekte enthalten.

Für die Verwendung von Verbindungen der Formel I oder sie enthaltende Mittel zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Agrarchemikalien kommen verschiedene Methoden und Techniken in Betracht, wie beispielsweise die folgenden:

i) Samenbeizung

a) Beizung der Samen mit einem als Spritzpulver formulierten Wirkstoff durch Schütteln in einem Gefäss bis zur gleichmässigen Verteilung auf der Samenoberfläche (Trockenbeizung). Man verwendet dabei etwa 10 bis 500 g Wirkstoff der Formel I (40 g bis 2 kg Spritzpulver) pro 100 kg Saatgut.

b) Beizung der Samen mit einem Emulsionskonzentrat des Wirkstoffs der Formel I nach der Methode a) (Nassbeizung).

c) Beizung durch Tauchen des Saatguts in eine Brühe mit 50-3200 ppm Wirkstoff der Formel I während 1 bis 72 Stunden und gegebenenfalls nachfolgendes Trocknen der Samen (Tauchbeizung).

Die Beizung des Saatguts oder die Behandlung des angekeimten Sämlings sind naturgemäss die bevorzugten Methoden der Applikation, weil die Wirkstoffbehandlung vollständig auf die Zielkultur gerichtet ist. Man verwendet in der Regel 10 g bis 500 g, vorzugsweise 50 bis 250 g AS pro 100 kg Saatgut, wobei man je nach Methodik, die auch den Zusatz anderer Wirkstoffe oder Mikronährstoffe ermöglicht, von den angegebenen Grenzkonzentrationen nach oben oder unten abweichen kann (Wiederholungsbeize).

ii) Applikation aus Tankmischung

Eine flüssige Aufarbeitung eines Gemisches von Gegenmittel und Herbizid (gegenseitiges Mengenverhältnis zwischen 10:1 und 1:10) wird

verwendet, wobei die Aufwandmenge an Herbizid 0,1 bis 10 kg pro Hektar beträgt. Solche Tankmischung wird vorzugsweise vor oder unmittelbar nach der Aussaat appliziert oder 5 bis 10 cm tief in den noch nicht gesäten Boden eingearbeitet.

iii) Applikation in die Saatzfurche


Das Gegenmittel wird als Emulsionskonzentrat, Spritzpulver oder als Granulat in die offene besäte Saatzfurche eingebracht und hierauf wird nach dem Decken der Saatzfurche in normaler Weise das Herbizid im Voraufverfahren appliziert.

iv) Kontrollierte Wirkstoffabgabe

Der Wirkstoff wird in Lösung auf mineralische Granulatträger oder polymerisierte Granulate (Harnstoff/Formaldehyd) aufgezogen und trocknen gelassen. Gegebenenfalls kann ein Ueberzug aufgebracht werden (Umhüllungsgranulate), der es erlaubt, den Wirkstoff über einen bestimmten Zeitraum dosiert abzugeben.

Die Herstellung von Verbindungen der Formel I erfolgt, indem man

a) eine Verbindung der Formel II



(II),


worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und M für Wasserstoff, ein Alkali- oder Erdalkalimetallatom steht, mit einer Verbindung der Formel III



(III)


worin X und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Z für einen abspaltbaren Rest steht, umgesetzt, oder

b) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für $-\text{COOR}_7$ steht, ein Säurehalogenid der Formel IV



(IV),


worin $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für ein Halogenatom steht, mit einer Verbindung der Formel V



(V),


worin R_7 die für Formel I angegebene Bedeutung hat und M' für Wasserstoff, ein Alkali- oder Erdalkalimetallatom steht, umgesetzt, oder

c) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für $-\text{COSR}_8$ steht, ein Säurehalogenid der Formel VI



(VI),


worin $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für ein Halogenatom steht, mit einer Verbindung der Formel VII



(VII),

worin R_8 die für Formel I angegebene Bedeutung hat und M'' für Wasserstoff, ein Alkali- oder Erdalkalimetallatom steht, umgesetzt, oder

d) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ steht, ein Säurehalogenid der Formel VIII



(VIII),


worin $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4, \text{R}_5, \text{R}_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für ein Halogenatom steht, mit einer Verbindung der Formel IX



(IX),


worin R_9 und R_{10} die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben, umsetzt, oder

e) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für $-\text{COOR}_7$ steht, eine Verbindung der Formel X



(X),


worin $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4, \text{R}_5, \text{R}_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Me für ein Alkalimetall-, Erdalkalimetall-, Blei- oder Silberatom steht, mit einer Verbindung der Formel XI



(XI),


worin R_7 die für Formel I angegebene Bedeutung hat und Hal für ein Halogenatom steht, umsetzt, oder

f) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für $-\text{COSR}_8$ steht, eine Verbindung der Formel XII



(XII),


worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Me' für ein Alkalimetall-, Erdalkalimetall-, Blei- oder Silberatom steht, mit einer Verbindung der Formel XIII



(XIII),


worin R_8 die für Formel I angegebene Bedeutung hat und Hal für ein Halogenatom steht, umgesetzt, oder

g) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für $-\text{COOR}_7$ steht, eine Verbindung der Formel XIV



(XIV),


worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben, mit einer Verbindung der Formel XV



(XV),

worin R_7 die für Formel I angegebene Bedeutung hat, umgesetzt, oder

h) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für $-\text{COSR}_8$ steht, eine Verbindung der Formel XVI




(XVI),

worin $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben, mit einer Verbindung der Formel XVII



worin R_8 die für Formel I angegebene Bedeutung hat, umgesetzt, oder

i) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für $-\text{COOR}_7$ steht, eine Verbindung der Formel Ia




worin $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und R_7' die für R_7 in Formel I angegebene Bedeutung hat, mit einer Verbindung der Formel XVIII




worin R_7'' die für R_7 in Formel I angegebene Bedeutung hat und nicht mit R_7' identisch ist, umgesetzt, oder

k) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für $-\text{OSR}_8$ steht, eine Verbindung der Formel Ib




worin $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und R_8' die für R_8 in Formel I angegebene Bedeutung hat, mit einer Verbindung der Formel XIX




1) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für $\text{-CONR}_9\text{R}_{10}$ steht, eine Verbindung der Formel XX




worin R_9 und R_{10} die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben, umsetzt, oder



m) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen X für $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ steht, eine Verbindung der Formel XXII




worin Y die für Formel I angegebene Bedeutung hat, umsetzt, oder



worin Y die für Formel I angegebene Bedeutung hat, umsetzt, oder

n) zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in denen Y für einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest steht, eine Verbindung der Formel XXIV



worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für ein Halogenatom, insbesondere ein Chlor- oder Bromatom, steht, in Gegenwart eines säurebindenden Mittels cyclisiert.

Bei der Verfahrensvariante a) kommt in der Verbindung der Formel III als abspaltbarer Rest Z insbesondere ein Halogenatom oder eine Methylsulfonyloxy-, Phenylsulfonyloxy- oder para-Tolylsulfonyloxygruppe in Betracht. Halogen steht hier für Fluor, Chlor, Brom und Jod, bevorzugt für Chlor und Brom.

Wenn in der Verbindung der Formel II M für Wasserstoff und in der Verbindung der Formel III Z für ein Halogenatom steht, so lässt sich die Umsetzung bevorzugt in Gegenwart eines üblichen Protonenakzeptors durchführen. Ferner wirkt, wenn in der Verbindung der Formel III Z für ein Halogenatom steht, die Zugabe einer geringen Menge Alkalijodid katalytisch.

Bei den Verfahrensvarianten b), c) und d) steht in den Verbindungen der Formeln IV, VI und VIII Hal für ein Halogenatom, wobei als Halogenatom Fluor, Chlor, Brom und Jod, vorzugsweise Chlor und Brom, in Betracht kommen.

Wenn bei den Verfahrensvarianten b) und c) in den Verbindungen der Formeln V oder VII M' oder M'' für Wasserstoff stehen, wird die Reaktion wie bei der Verfahrensvariante d) vorzugsweise in Gegenwart eines säurebindenden Mittels durchgeführt.

Als Säurehalogenide der Verbindungen IV, VI und VIII kommen vorzugsweise Halogenwasserstoffsäuren, insbesondere Chlor- und Bromwasserstoffsäure, in Betracht.

Bei den Verfahrensvarianten g) und h) lässt sich das bei der Umsetzung entstehende Wasser beispielsweise mittels eines Wasserabscheiders aus dem Reaktionsgemisch entfernen. Durch Zugabe von Säure wird eine katalytische Wirkung erzielt.

Die Umesterung gemäss den Verfahrensvarianten i) und k) kann durch Zusatz von Säure oder Base katalytisch beeinflusst werden. Vorteilhafterweise wird die Umsetzung mit einem Ueberschuss an Verbindungen der Formeln XVIII oder XIX durchgeführt.

Bei der Verfahrensvariante l) steht in den Verbindungen der Formel XX R' vorzugsweise für einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, insbesondere Methyl oder Aethyl.

Die Umsetzungen gemäss Verfahrensvarianten a) bis n) werden zweckmässigerweise in Gegenwart von gegenüber den Reaktionsteilnehmern inerten Lösungsmitteln durchgeführt. Als inerte Lösungsmittel kommen beispielsweise Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol, Xylol, Petroläther oder Cyclohexan, Aether wie beispielsweise Diäthyläther, Tetrahydrofuran, Dioxan, Dimethoxyäthan oder Diäthylenglykol-dimethyläther, Säureamide wie beispielsweise Dimethylformamid, 2-Pyrrolidinon oder Hexamethylphosphorsäuretriamid oder Sulfoxide wie beispielsweise Dimethylsulfoxid in Betracht.

Als säurebindende Mittel können beispielsweise Alkalimetall- und Erdalkalimetallhydroxide oder -alkoholate, Alkalicarbonate oder tertiäre organische Basen eingesetzt werden.

Die Reaktionstemperaturen liegen im allgemeinen in einem Bereich von 0 bis 200°C, insbesondere im Bereich von 50 bis 150°C.

Die in den Verfahrensvarianten a) bis n) verwendeten Ausgangsprodukte sind bekannt oder können analog bekannten Verfahren hergestellt werden.


Aus der Literatur ist eine Anzahl von Chinolinderivaten und ihre Verwendung in verschiedenen Anwendungsbereichen bekannt. So beschreiben beispielsweise die amerikanische Patentschrift 4.176.185, die britischen Patentschriften 760.319, 989.578, 1.003.477 und 1.003.478, die schweizerische Patentschrift 408.007, die DE-OS 25 46 845, Areschke, A. et al., Eur.J.Med.Chem.-Chimica Therapeutica, Sept.-Okt. 1975-10, No. 5, 463-469, Major R.T. et al., J. Med. Pharm. Chem. 4, 317-326, 1961, und Thompson, H.E., Botan. Gaz. 107, 476-507, 1946, den Einsatz von Chinolinderivaten auf therapeutischem Gebiet, als Ausgangsprodukt zur Herstellung therapeutischer Wirkstoffe, als Mittel zur Wachstumsförderung bei Tieren, als Pflanzenwuchshemmer oder als Herbizide.

Einen Bestandteil der vorliegenden Erfindung bilden neue Chinolinderivate der Formel I. Besonders erwähnenswert sind neue Verbindungen der Formel I, die zu einer der vorgängig aufgeführten Untergruppen o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), z^1), z^2), z^3) und z^4) gehören.

Beispiel 1: 23,2 g 8-Hydroxychinolin werden in der Wärme in 400 ml Butanon-2 gelöst und portionenweise mit 30 g Kaliumcarbonat versetzt. Das Gemisch wird eine Stunde unter Rückfluss erhitzt. Anschliessend werden zunächst 2 g Kaliumjodid und dann unter Rühren und Kochen 40 g 2-Brompropionsäuremethylester in 100 ml Butanon-2 innerhalb einer Stunde zugetropft. Dann wird das Gemisch noch 10 Stunden unter Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird das Gemisch auf 1 Liter Wasser gegossen und dreimal mit je 200 ml Aethylacetat extrahiert. Die vereinigten Extrakte werden einmal mit 50 ml Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und filtriert. Das Lösungsmittel wird verdampft und der ölige Rückstand durch Anreiben mit Petroläther zur Kristallisation gebracht. Nach dem Umkristallisieren aus Hexan erhält man 2-(8-Chinolinox)-propionsäuremethylester (Verbindung Nr. 3) in Form beigefarbener Kristalle. Smp. 70 bis 72° C.

Analog einer der vorstehend beschriebenen Methoden lassen sich auch die folgenden, in der Tabelle 1 zusammen mit der Verbindung des vorstehenden Beispiels aufgeführten Verbindungen der Formel I herstellen:

Tabelle 1



Verbindung No.	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	X	Y	Physikal. Konstante
1	Cl	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	--COOCH_3	Smp. 65-66° C
2	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{--COO}(\text{CH}_2)_3\text{--CH}_3$	
3	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	--COOCH_3	Smp. 70-72° C
4	H	H	H	H	H	H	$\text{--CH}_2\text{--}$	$\text{--COOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$	Smp. 184-185° C

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
5	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOH	
6	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₂ CH ₂ OCH ₃	Smp. 80-82°C
7	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOCH ₂ CH ₂ OCH ₃	
8	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₃	Smp. 46.5-67.0°C
9	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOCH ₂ CH ₂ OC ₂ H ₅	
10	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 \\ \quad \quad \\ \text{COOCH} \quad \text{C} - \text{CH} = \text{CH}_2 \\ \quad \quad \quad \\ \quad \quad \quad \text{CH}_2 \end{array} $	

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
11	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₂ H ₅ • H ₂ O	Smp. 56-59°C
12	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOCH ₂ CH(CH ₃) CH ₃	
13	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-CONH(CH ₂) ₃ OC ₂ H ₅	Smp. 54-56°C
14	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOCH ₂ - 	
15	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOC ₂ H ₅	
16	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-CONHCH ₂ CH(CH ₃) CH ₃	

Tabelle 1 (Fortsetzung)



Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
17	H	H	H	H	H	H	-CH- $\quad $ CH_3	$\text{-CONHC}_2\text{H}_5$	Smp. 86-88°C
18	H	H	H	H	H	H	-CH- $\quad $ CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH(CH}_3)_2$	
19	H	H	H	H	H	H	-CH- $\quad $ CH_3	-CON- 	
20	H	H	H	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{-}$	$\text{-COOC}_3\text{H}_7$	Smp. 28-31°C
21	H	H	H	H	H	H	-CH- $\quad $ CH_3	$\text{-COOCH(CH}_3)_2$	
22	H	H	H	H	H	H	-CH- $\quad $ CH_3	-CONH- 	

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
23	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CONH---CH}_2\text{---} \\ \\ \text{O} \end{array}$
24	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CON---CH}_2\text{---} \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$
25	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CONH---CH---} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$
26	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOCH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$
27	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CON---} \\ \quad \quad \\ \text{C}_2\text{H}_5 \quad \text{C}_4\text{H}_9 \end{array}$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
28	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₃ H ₇ iso	n _D ²³ = 1,5696
29	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOCH ₂ CH ₂ OH	
30	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \\ -\text{COSCH} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
31	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ -\text{CONHCH}_2\text{CH}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3 \end{array}$	
32	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-CONHCH ₃ • H ₂ O	Smp. 74-81°C
33	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-COSC ₂ H ₅	

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
34	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCH} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \end{array} \text{CH}_3$	
35	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		
36	H	H	H	H	H	H	$-\text{CH}_2-$	$-\text{CON} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \end{array} \text{CH}_3$	Smp. 142-145°C
37	H	H	H	H	H	H	$-\text{CH}_2-$	$-\text{CONHC} \begin{array}{c} \text{H}_5 \\ \end{array}$	$n_D^{22,5} = 1,6002$
38	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{COOCH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$	

Tabelle 1 (Fortsetzung)



Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
39	H	H	NO ₂	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	---COOH
40	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	---CONHCH ₂ ---CH=CH ₂
41	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
42	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	---CONHCH ₂ CH ₂ Br
43	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	

Tabelle 1 (Fortsetzung)



Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
44	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{COOCH}_2-\text{C}=\text{CH}_2 \end{array}$
45	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
46	H	H	H	H	H	H	$-\text{CH}_2-$	$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ -\text{CON}- \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$
47	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
48	H	H	NO ₂	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
49	H	H	H	H	H	H	-CH- $\quad $ CH_3	-CONHCH $\quad \quad $ $\text{C}_2\text{H}_5 \quad \text{CH}_2\text{OH}$
50	H	H	H	H	H	H	-CH- $\quad $ CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$
51	H	H	H	H	H	H	-CH- $\quad $ CH_3	$\text{-CONH-C-CH}_2\text{OH}$ $\quad \quad $ $\text{C}_2\text{H}_5 \quad \text{C}_2\text{H}_5$
52	H	H	H	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{-}$	-CONH_2
53	H	H	H	H	H	H	-CH- $\quad $ CH_3	-CONH- $\quad $ 

Tabelle 1 (Fortsetzung)



Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
54	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		
55	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---CONHCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$	
56	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---CONH(CH}_2)_3\text{OH}$	Smp. 120-122°C
57	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		
58	H	H	H	H	H	H	$\text{---CH}_2\text{---}$	$\text{---COOCH}_2\text{CH}_2\text{OC}_2\text{H}_5$	$n_D^{24} = 1,5673$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
59	H	H	H	H	H	H	--CH-- $\quad $ CH_3	--CONH_2
60	H	H	H	H	H	H	--CH-- $\quad $ CH_3	--COOCH_2 $\quad \diagup \quad \diagdown$ $\text{O} \quad \text{O}$ $\diagdown \quad \diagup$ OCH_3
61	H	H	H	H	H	H	--CH-- $\quad $ CH_3	--CONH-- $\quad \diagup \quad \diagdown$ $\text{O} \quad \text{O}$ $\diagdown \quad \diagup$ OCH_3
62	H	H	NO ₂	H	H	H	--CH-- $\quad $ CH_3	--COOCH_3

Tabelle 1 (Fortsetzung)



Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
63	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		
64	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{--CONH(CH}_2)_3\text{OCH}_3$	
65	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		Smp. 88-90°C
66	H	H	NO ₂	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{--COOC}_2\text{H}_5$	
67	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	--CONHCH_3	

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
68	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CON---CH}_2\text{---CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \\ \\ \text{---} \end{array}$	
69	H	H	H	H	H	H	$\text{---CH}_2\text{---}$	$\text{---CONH(CH}_2\text{)}_3\text{CH}_3$	Smp. 66-68°C
70	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CON---CH(CH}_3\text{)---CH(CH}_3\text{)---CH}_2\text{---} \\ \\ \text{---} \end{array}$	
71	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CON---CH(CH}_3\text{)---CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \\ \\ \text{---} \end{array}$	$n_D^{22} = 1,6054$
72	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CON---CH(CH}_3\text{)---CH}_2\text{---} \\ \\ \text{---} \end{array}$	
73	H	H	NO ₂	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOC}_3\text{H}_7$	

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
74	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONH(CH}_2)_3\text{-N(CH}_2)_2\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{-CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
75	H	H	NO ₂	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOC}_3\text{H}_7\text{ iso}$
76	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CON(CH}_2\text{CHCH}_3)_2$ OH
77	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CON(CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3)_2$
78	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONH(CH}_2)_3\text{NHCH}_3$
79	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{Br}$
80	H	H	NO ₂	H	H	H	-CH-CH_3	-CONHCH_3
81	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COO(CH}_2)_4\text{OH}$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
82	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CON}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH} \end{array}$	Smp. 146-149°C
83	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{COOCH}-\text{CH}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	
84	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{COOCH}_2-\text{CHCH}_2-\text{CH}_3 \end{array}$	
85	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOCH ₂ -C≡C-CH ₂ OH	
86	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ -\text{COOCH}_2-\text{C}-\text{C}-\text{O}- \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$	zähe Masse
87	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOC ₄ H ₉ ⁿ	
88	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{COO}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \end{array}$	

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
89	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{COOCH}-\text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$	
90	H	H	NO ₂	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CON}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
91	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{CONH}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Smp. 73-76°C
92	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{COO}-\text{CH}-\text{COOC}_4\text{H}_9 \end{array}$	
93	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CONH}-\text{CH}-\text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$	
94	H	H	NO ₂	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{CONH}_2$	
95	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \\ \\ -\text{CON}- \\ \\ (\text{CH}_2)_3\text{CH}_3 \end{array}$	

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
96	H	H	NO ₂	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{OC}_2\text{H}_5$
97	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COS(CH}_2)_3\text{CH}_3$
98	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	
99	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CON(CH}_3\text{)(CH}_2)_3\text{CH}_3$
100	Br	H	Cl	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{-}$	-COOCH_3
101	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{OC}_4\text{H}_9$
102	Br	H	Cl	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{-}$	$\text{-COOC}_2\text{H}_5$
103	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
104	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CON}- \\ \\ \text{H} \end{array}$
105	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{Cl} \\ \\ \text{CONH}- \\ \\ \text{H} \end{array}$
106	Br	H	Cl	H	H	H	$-\text{CH}_2-$	$-\text{COOC}_3\text{H}_7^n$
107	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{Cl} \\ \\ \text{COOCH}_2- \\ \\ \text{H} \end{array}$
108	Br	H	Cl	H	H	H	$-\text{CH}_2-$	$-\text{CONHCH}_3$
109	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{Cl} \\ \\ \text{CONH}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{H} \end{array}$
110	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CON}- \\ \\ \text{H} \end{array}$

Tabelle 1 (Fortsetzung)



Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
111	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
112	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{COOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$
113	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
114	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{COO}(\text{CH}_2)_3\text{Cl}$
115	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{CONH}(\text{CH}_2)_3\text{Cl}$
116	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{COOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{NO}_2$

Tabelle 1 (Fortsetzung)






Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
117	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-COS- 
118	Br	H	Cl	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{-}$	-CON- 
119	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{-CH=CH-CH}_3$
120	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-COO- 
121	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-CONH- 
122	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-CON- 
123	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COO(CH}_2\text{)}_{10}\text{OH}$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
124	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COO(CH}_2)_9\text{CH}_3$
125	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---CONH(CH}_2)_9\text{CH}_3$
126	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \\ \\ \text{---CON---} \\ \\ \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \end{array}$
127	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{---CON---} \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$
128	Br	H	Cl	H	H	H	$\text{---CH}_2\text{---}$	---CONH_2
129	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{---COOCH}_2\text{CH}_2\text{N---} \\ \quad \quad \quad \\ \text{C}_2\text{H}_5 \quad \quad \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$
130	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{---CONHCH}_2\text{CH}_2\text{N---} \\ \quad \quad \quad \\ \text{C}_2\text{H}_5 \quad \quad \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$
131	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OC}_2\text{H}_5$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
132	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CON---} \\ \\ \text{H} \end{array}$	Smp. 120-121°C
133	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CONH(CH}_2)_3\text{---N---} \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \\ \text{C}_2\text{H}_5 \qquad \qquad \qquad \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$	
134	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OC}_4\text{H}_9$	
135	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$	
136	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	
137	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CON---} \\ \qquad \qquad \qquad \\ \text{CH}_2\text{CH=CH}_2 \qquad \text{CH}_2\text{CH=CH}_2 \end{array}$	
138	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CON---} \\ \qquad \qquad \qquad \\ \text{CH}_2\text{CH=CH}_2 \qquad \text{CH}_2\text{CH=CH}_2 \end{array}$	

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
139	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONH(CH}_2)_6\text{NH}_2$
140	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH(CH}_2\text{Br)}_2$
141	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONC}_4\text{H}_9\text{C}_4\text{H}_9\text{n}$
142	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-COO- 
143	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONH(CH}_2)_8\text{NH}_2$
144	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{N(CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3)_2$
145	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONHCH}_2\text{CH}_2\text{N(C}_4\text{H}_9\text{n)}_2$
146	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONH(CH}_2)_3\text{NH}_2$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
147	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{COO} \text{---} \text{C}(\text{CH}_3)_3 \\ \\ \text{C}(\text{CH}_3)_3 \end{array}$
148	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{COO}(\text{CH}_2)_{17}\text{CH}_3$
149	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{COOCH}(\text{CH}_2\text{Cl})_2$
150	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{CON} \left(\begin{array}{c} \text{C}(\text{H})_2 \\ \\ \text{C}(\text{H})_2 \end{array} \right)_2$
151	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{CON}(\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2)_2$
152	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{NO}_2$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
153	H	H	H	H	H	H	--CH--CH_3	$\text{--CON(CH(CH}_3)_2)_2$	
154	H	H	H	H	H	H	--CH--CH_3	$\text{--COOCH}_2\text{CH}_2\text{N(CH(CH}_3)_2)_2$	
155	H	H	H	H	H	H	--CH--CH_3	$\text{--CON(CH(CH}_3)_2)_2$	Smp. 105-111°C
156	Br	H	Cl	H	H	H	$\text{--CH}_2\text{CH}_2\text{--}$	--COOCH_3	
157	H	H	H	H	H	H	--CH--CH_3	$\text{--COOCH}_2\text{CH}_2\text{N(CH(CH}_3)_2)_2$	
158	H	H	H	H	H	H	--CH--CH_3	$\text{--CONH--O--O--NO}_2$	
159	H	H	H	H	H	H	--CH--CH_3	$\text{--COOCH}_2\text{CH}_2\text{N(CH(CH}_3)_2)_2$	

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
160	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{COOCHCH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2 \end{array}$
161	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{COO}(\text{CH}_2)_3\text{N}(\text{CH}_3)_2 \end{array}$
162	Br	H	Cl	H	H	H	$-\text{CH}_2\text{CH}_2-$	$-\text{COOCH}_3$
163	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CONH}(\text{CH}_2)_3\text{N}(\text{CH}_3)_2 \end{array}$
164	Br	H	Cl	H	H	H	$-\text{CH}_2\text{CH}_2-$	$-\text{COOC}_2\text{H}_5$
165	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{COO}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$

Tabelle 1 (Fortsetzung)



Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
166	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NO}_2 \\ \\ \text{---COO---} \end{array}$  ---NO_2
167	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---CON(C}_5\text{H}_{11}\text{n)}_2$
168	Br	H	Cl	H	H	H	$\text{---CH}_2\text{CH}_2\text{---}$	$\text{---COOC}_3\text{H}_7\text{n}$
169	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---CON}\left(\text{---}\langle\text{---}\rangle\text{---}\right)_2$ 
170	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---CON(C}_3\text{H}_7\text{n)}_2$
171	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COO(CH}_2\text{)}_{11}\text{CH}_3$
172	Br	H	Cl	H	H	H	$\text{---CH}_2\text{CH}_2\text{---}$	---CONH_2
173	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---CONH(CH}_2\text{)}_{11}\text{CH}_3$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
174	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---COOCH}_2\text{---} \\ \\ \text{O} \end{array}$
175	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COS(CH}_2\text{)}_{11}\text{CH}_3$
176	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CONH---CH}_2\text{---} \\ \\ \text{O} \end{array}$
177	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---COOCH}_2\text{CH---CH}_2\text{OH} \\ \\ \text{OH} \end{array}$
178	Br	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	---COOCH_3
179	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COO(CH}_2\text{)}_6\text{CH}_3$
180	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COO(CH}_2\text{)}_{15}\text{CH}_3$
181	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COO(CH}_2\text{)}_6\text{OH}$

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
182	Br	H	Cl	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOC}_2\text{H}_5$
183	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH(CH}_3\text{)(CH}_2\text{)}_2\text{CHOH}$
184	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COO(CH}_2\text{)}_5\text{CH}_3$
185	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONH(CH}_2\text{)}_5\text{CH}_3$
186	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-COO- 
187	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONHCH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
188	Br	H	Cl	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOC}_3\text{H}_7^{\text{iso}}$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
189	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{N} \begin{array}{c} \diagup \text{H} \diagdown \\ \vdots \quad \vdots \end{array}$
190	Br	H	Cl	H	H	H	-CH-CH_3	-CONHCH_3
191	Br	H	Cl	H	H	H	-CH-CH_3	-CONH_2
192	Br	H	Cl	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CON} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{array}$
193	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{N} \begin{array}{c} \diagup \text{H} \diagdown \\ \vdots \quad \vdots \end{array}$
194	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{-I} \begin{array}{c} \diagup \text{H} \diagdown \\ \vdots \quad \vdots \end{array}$

Tabelle 1 (Fortsetzung)



Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
195	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CN}$
196	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONH(CH}_2)_3\text{COOCH}_3$
197	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COO-C(CH}_3)_2\text{-COOC}_2\text{H}_5$
198	Cl	H	Cl	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{-}$	-COOH
199	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{-}$ 
200	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{-}$ 
201	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{CN}$

Tabelle 1 (Fortsetzung)





Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
202	Cl	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₂ CH ₂ OCH ₃
203	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	
204	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	
205	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	
206	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	
207	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	-CONH(CH ₂) ₁₇ CH ₃
208	Cl	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₃

Tabelle 1 (Fortsetzung)




Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
209	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COO(CH}_2)_7\text{CH}_3$
210	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-COO- 
211	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{-}$ 
212	Cl	H	Cl	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{-}$	$\text{-COOC}_2\text{H}_5$
213	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONH(CH}_2)_7\text{CH}_3$
214	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-CONH-CH- 
215	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COO(CH}_2)_4\text{CH}_3$

Tabelle 1 (Fortsetzung)





Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
216	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONHCH}_2\text{CH}_2\text{-}$ 
217	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-}$ 
218	Cl	H	Cl	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{-}$	$\text{COOC}_3\text{H}_7^{\text{iso}}$
219	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	 -CON-
220	Cl	H	Cl	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{-}$	-CONH_2
221	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-CON- 
222	Cl	H	Cl	H	H	H	-CH-CH_3	-COOH

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
223	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{---CONHCH}_2\text{CH}_2\text{---} \\ \\ \text{H} \end{array}$
224	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOCH}_2\text{---C}\equiv\text{CH}$
225	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOCH}_2\text{CH}_2(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_3\text{OH}$
226	Cl	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$
227	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
228	Cl	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOC}_2\text{H}_5$
229	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COSCH}_2\text{COOCH}_3$
230	Cl	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOC}_3\text{H}_7$

Tabelle 1 (Fortsetzung)





Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
231	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-COS- 
232	Cl	H	Cl	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOC}_3\text{H}_7\text{iso}$
233	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-CONH- 
234	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{CCl}_3$
235	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-COOCH}_2\text{-C(CH}_2\text{OH)}_2\text{-C}_2\text{H}_5$
236	H	H	H	H	H	H	-CH-CH_3	-CON- 
237	Cl	H	Cl	H	H	H	-CH-CH_3	-CON- 

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
238	H	H	J	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH-} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOH
239	H	H	Br	H	H	CH ₃	$\begin{array}{c} \text{CH-} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOH
240	Cl	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH-} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-CONHC ₂ H ₅
241	H	H	J	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH-} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOCH ₂ CH ₂ OCH ₃
242	H	H	Br	H	H	CH ₃	$\begin{array}{c} \text{CH-} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOCH ₂ CH ₂ OCH ₃
243	Cl	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH-} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-CONH ₂
244	H	H	J	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH-} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOCH ₃
245	H	H	Br	H	H	CH ₃	$\begin{array}{c} \text{CH-} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOCH ₃
246	H	H	J	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH-} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOC ₂ H ₅

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
247	H	H	J	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	---CONHCH_3
248	H	H	Br	H	H	CH ₃	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{---CON---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
249	H	H	Br	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	---COOH
250	H	H	Br	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{---COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$
251	H	H	J	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{---CON---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
252	H	H	Br	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	---COOCH_3
253	H	H	Cl	H	H	CH ₃	$\text{---CH}_2\text{---}$	---COOCH_3
254	H	H	Br	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{---CH---} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	---CONH_2
255	H	H	Cl	H	H	CH ₃	$\text{---CH}_2\text{---}$	$\text{---COOC}_2\text{H}_5$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
256	H	H	Br	H	H	H	-CH-CH_3	$\text{-CONHC}_2\text{H}_5$
257	H	H	Cl	H	H	CH ₃	$\text{-CH}_2\text{-}$	-CONHCH_3
258	H	H	H	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{CH}_2\text{-}$	-COOH
259	H	H	Cl	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{CH}_2\text{-}$	$\text{-COOC}_2\text{H}_5$
260	H	H	Cl	H	H	CH ₃	$\text{-CH}_2\text{-}$	$\text{-CON-CH}_2\text{CH}_3$
261	H	H	H	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{CH}_2\text{-}$	$\text{-COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$
262	H	H	Cl	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{CH}_2\text{-}$	$\text{-COOC}_3\text{H}_7\text{iso}$
263	H	H	Cl	H	H	CH ₃	-CH-CH_3	-COOH
264	H	H	H	H	H	H	$\text{-CH}_2\text{CH}_2\text{-}$	-COOCH_3
265	H	H	Cl	H	H	CH ₃	-CH-CH_3	-COOCH_3

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
266	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-COOC ₂ H ₅
267	H	H	Cl	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-COOC ₂ H ₅
268	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-COOC ₃ H ₇ ⁿ
269	H	H	Cl	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-COOC ₃ H ₇ ^{iso}
270	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-CONHC ₃ H ₇ ^{iso}
271	H	H	Cl	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-CONHCH ₃
272	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-CONHCH ₃
273	H	H	Cl	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-CON- CH ₃ CH ₃
274	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-CON- CH ₃ CH ₃

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
275	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CON}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
276	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-CONHC ₂ H ₅	
277	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-CONHC ₂ H ₅	
278	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-CONH ₂	
279	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ -\text{CON}- \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$	
280	H	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOH	
281	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-CONH ₂	
282	H	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOCH ₂ CH ₂ OCH ₃	

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
283	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-COOCH ₂ CH ₂ OC ₂ H ₅	
284	H	H	Cl	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOCH ₃	
285	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-CON- CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	
286	H	H	Cl	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOC ₂ H ₅	
287	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOH	Smp. 232-233°C
288	H	H	Cl	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOC ₃ H ₇ ⁿ	
289	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₂ CH ₂ OCH ₃	Smp. 97-98°C
290	H	H	Cl	H	H	H	-CH- CH ₃	-CONHCH ₃	
291	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₃	Smp. 104-105,5°C

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
292	H	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CON}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
293	H	H	Cl	H	H	H	$-\text{CH}_2-$	$-\text{COOC}_2\text{H}_5$	Smp. 116-117°C
294	H	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{CONHC}_2\text{H}_5$	
295	H	H	Cl	H	H	H	$-\text{CH}_2-$	$-\text{COOC}_3\text{H}_7$	Smp. 108-109°C
296	H	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \\ -\text{CON}- \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$	
297	H	H	Cl	H	H	H	$-\text{CH}_2-$	$-\text{CONHCH}_3$	
298	H	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{CONH}_2$	
299	H	H	Cl	H	H	H	$-\text{CH}_2-$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CON}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	Smp. 135-136°C
300	H	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$-\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{OC}_2\text{H}_5$	

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
301	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-CONH ₂	
302	H	H	Cl	H	H	H	-CH- CH ₃	-CONH(CH ₂) ₃ CH ₃	
303	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-COOH	
304	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-COOCH ₂ CH ₂ OCH ₃	
305	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	-COOCH ₃	
306	H	H	Cl	H	H	H	-CH- CH ₃	-CON- CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH	
307	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH ₂ -	-COOCH ₃	Smp. 58-66°C
308	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-COOH	
309	H	H	Cl	H	H	H	-CH- CH ₃	-COOCH ₂ - 	
310	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH ₂ -	-CON- CH ₃ CH ₃	

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
311	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-COOCH ₃
312	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-COOC ₃ H ₇ iso
313	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-CON- CH ₃ CH ₃
314	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-CONHCH ₃
315	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-CON- C ^H ₂ ^H ₅ C ^H ₂ ^H ₅
316	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH- CH ₃	-CONH ₂

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
317	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	
318	H	H	Cl	H	H	H	-CH- CH ₃	"
319	Br	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	"
320	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH ₂ -	"
321	Br	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	"
322	Cl	H	Cl	H	H	CH ₃	-CH ₂ -	"
323	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	"
324	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH ₂ CH ₂ -	"
325	Br	H	Cl	H	H	H	-CH- CH ₃	"
326	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	"
327	H	H	H	H	H	H	-CH- CH ₃	"
328	Cl	H	Cl	H	H	CH ₃	-CH ₂ CH ₂ -	"

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
329	H	H	H	H	H	CH ₃	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
330	H	H	Br	H	H	H	$\text{--CH}_2\text{--}$	"
331	Cl	H	Cl	H	H	CH ₃	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	"
332	H	H	Cl	H	H	H	$\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--}$	"
333	H	H	Br	H	H	H	$\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--}$	"
334	H	H	C ₂ H ₅	H	H	H	$\text{--CH}_2\text{--}$	"
335	H	H	Br	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{--CH--} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	"
336	H	H	C ₂ H ₅	H	H	H	$\text{--CH}_2\text{CH}_2\text{--}$	"
337	Cl	H	Cl	H	H	H	$\text{--CH}_2\text{--}$	"
338	J	H	Cl	H	H	H	$\text{--CH}_2\text{--}$	"
339	J	H	Cl	H	H	H	$\text{--CH}_2\text{CH}_2\text{--}$	"

Tabelle 1 (Fortsetzung)





Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y
340	Cl	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ CH ₂ -	
341	H	H	C ₂ H ₅	H	H	H		"
342	Cl	H	Cl	H	H	H		"
343	J	H	Cl	H	H	H		"

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X + Y	Physikalische Konstante °C
344	H	H	H	H	H	H		
345	H	H	Cl	H	H	H	"	140-141.5°C
346	Cl	H	Cl	H	H	H	"	
347	H	H	H	H	H	CH ₃	"	
348	H	H	Br	H	H	H	"	
349	Br	H	Cl	H	H	H	"	
350	H	H	Br	H	H	CH ₃	"	
351	H	H	Cl	H	H	CH ₃	"	
352	H	H	J	H	H	H	"	
353	J	H	Cl	H	H	H	"	
354	Cl	H	Cl	H	H	CH ₃	"	
355	H	H	NO ₂	H	H	H	"	
356	H	H	C ₂ H ₅	H	H	H	"	
357	Cl	H	CH ₃	H	H	H	"	

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
358	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH ₂ -	-COOC ₂ H ₅	$n_D^{22,5} = 1,5762$
359	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₄ H ₉ tert.	Smp. 63-69°C
360	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₄ H ₉ tert.	Smp. 68-70°C
361	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₂ -C≡CH	Smp. 115-116°C
362	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₃ H ₇ iso	Smp. 147-148°C
363	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₂ CH ₂ OC ₂ H ₅	Smp. 102-104°C
364	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -		Smp. 110-112°C
365	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₂ -CH=CH ₂	Smp. 98-99°C
366	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COO(CH ₂) ₁₁ CH ₃	Smp. 76-77°C
367	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₄ H ₉ sek.	Smp. 110-111°C
368	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COO(CH ₂) ₇ CH ₃	$n_D^{24} = 1,5419$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
369	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₄ H ₉ n	Smp. 90,5-92°C
370	H	H	H	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{C}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOC ₂ H ₅	$n_D^{24} = 1,5600$
371	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COO(CH ₂) ₁₁ CH ₃	$n_D^{23} = 1,5232$
372	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₂ -CH=CH ₂	$n_D^{23} = 1,5885$
373	H	H	Cl	H	H	H	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{C}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	-COOC ₂ H ₅	Smp. 57-58°C
374	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COO(CH ₂) ₇ CH ₃	Smp. 87-88°C
375	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₄ H ₉ n	$n_D^{22} = 1,5642$
376	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₄ H ₉ sek.	Oel (rot)

Tabelle 1 (Fortsetzung)



Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
377	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₂ CH ₂ Cl	Smp. 125-126°C
378	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -		$n_D^{23,5} = 1,6099$
379	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -		Smp. 101-103°C
380	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COS(CH ₂) ₇ CH ₃	Smp. 53-54°C
381	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₂ CH ₂ Cl	Smp. 109-110°C
382	J	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₄ H ₉ tert.	Smp. 81-97°C
383	J	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₂ H ₅	Smp. 92-94°C
384	J	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COO(CH ₂) ₁₁ CH ₃	Smp. 51-53°C
385	J	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₃	Smp. 121-126°C
386	J	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOCH ₂ CH ₂ Cl	Smp. 44-45°C

Tabelle 1 (Fortsetzung)





Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
387	J	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -		Smp. 112-113°C
388	J	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₃ H ₇ ⁿ	Smp. 71-73°C
389	H	H	H	H	H	CH ₃		-COOC ₂ H ₅	Smp. 47-53°C
390	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOC ₄ H ₉ ^{iso}	²² _D = 1,5632
391	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -		²² _D = 1,5391
392	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -		²² _D = 1,5342
393	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-CONH(CH ₂) ₁₁ CH ₃	Smp. 56-61°C

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
394	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ -\text{CONHCH}_2\text{CH}_2-\text{N}- \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$	Smp. 94-99°C
395	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-CONHCH ₂ CH ₂ CH ₂ OH	Smp. 138-139°C
396	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \diagup \quad \diagdown \\ -\text{CONH}-\text{N}- \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$	Smp. 104-106°C
397	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ -\text{CON}-\text{N}- \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$	Smp. 99-103°C
398	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{C}_2\text{H}_5 \\ \diagup \quad \diagdown \\ -\text{CONHCH}_2\text{CH}_2-\text{N}- \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$	$n_D^{23} = 1,5686$
399	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \\ \diagup \quad \diagdown \\ -\text{CON}-\text{N}- \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$	Smp. 144-146°C
400	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \quad \diagdown \\ -\text{CONH}(\text{CH}_2)_3-\text{N}- \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$	$n_D^{23} = 1,5766$

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
401	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CON}-\text{C}_{4\text{H}_9}^n \end{array}$	$\eta_D^{22} = 1,5840$
402	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{---} \text{O} \text{---} \\ \quad \quad \\ -\text{CONHCH}_2-\text{CH}_2-\text{O}- \end{array} \cdot \text{H}_2\text{O}$	Smp. 70,5-73,5°C
403	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ -\text{CONHCHCH}_2-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$	Smp. 150-151°C
404	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\begin{array}{c} \text{C}_{4\text{H}_9}^n \\ \\ -\text{CON}-\text{C}_{4\text{H}_9}^n \end{array} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Smp. 105-106°C
405	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$-\text{CONHCH}_2\text{CH}_2-\text{N} \begin{array}{c} \diagup \text{O} \diagdown \\ \diagdown \text{O} \diagup \end{array}$	$\eta_D^{26} = 1,5821$
406	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$-\text{CONH}(\text{CH}_2)_3\text{N} \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \\ \quad \quad \\ \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \end{array}$	Smp. 109-110°C

Tabelle 1 (Fortsetzung)





Verbindung; No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
407	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-CONHCH ₂ -CH=CH ₂ • H ₂ O	Smp. 71-75°C
408	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	 • H ₂ O	Smp. 57-58°C
409	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-CONH(CH ₂) ₃ OC ₂ H ₅	Smp. 51-61°C
410	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-CONHCH ₂ CH ₂ NHCH ₂ CH ₂ OH	Smp. 70-91°C
411	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-CONH(CH ₂) ₃ OC ₂ H ₅	Smp. 85-88°C
412	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -		Smp. 187-189°C
413	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -		Smp. 177-179°C
414	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -		Smp. 148-150°C

Tabelle 1 (Fortsetzung)


Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
415	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-CONHCH ₂ CH ₂ CH ₂ OH	Smp. 157-160°C
416	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-CONHC ₄ H ₉ ⁿ • H ₂ O	Smp. 87-90°C
417	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-CONHC ₂ H ₅	Smp. 94-98°C
418	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-CONHCH ₂ -  • $\frac{1}{2}$ H ₂ O	Smp. 146-149°C
419	H	H	H	H	H	CH ₃	-CH ₂ -	-CONH ₂	Smp. 193-196°C
420	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-CONHNH ₂ • H ₂ O	Smp. 121-124°C
421	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COONa • H ₂ O	Smp. 140-142°C
422	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COOK • H ₂ O	Smp. > 200°C
423	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	-COO [⊖] HN(CH ₃) ₃ [⊕]	Smp. 176-178 °C

Tabelle 1 (Fortsetzung)

Verbindung No.	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	X	Y	Physikal. Konstante
424	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\text{-COO}^{\ominus} \text{HN}^{\oplus}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH})_3$	Smp. 97-98°C
425	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COOK · H ₂ O	Smp. > 260°C
426	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	-COONa · H ₂ O	Smp. > 260°C
427	H	H	H	H	H	H	-CH ₂ -	$\text{-COO}^{\ominus} \text{HN}^{\oplus}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$	Smp. 255-257°C (Z)
428	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	$\text{-COO}^{\ominus} \text{NH}_4^{\oplus}$	Smp. 227-228°C (Z)
429	H	H	Cl	H	H	H	-CH ₂ -	$\text{-COO}^{\ominus} \text{HN}^{\oplus}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH})_3$	Smp. 132-156°C (Z)

Formulierungsbeispiele für flüssige Wirkstoffe der Formel I(% = Gewichtsprozent)

<u>2. Emulsions-Konzentrate</u>	a)	b)	c)
Wirkstoff aus Tabelle 1	25 %	40 %	50 %
Ca-Dodecylbenzolsulfonat	5 %	8 %	6 %
Ricinusöl-polyäthylenglykoläther (36 Mol AeO)	5 %	-	-
Tributylphenol-polyäthylenglykoläther (30 Mol AeO)	-	12 %	4 %
Cyclohexanon	-	15 %	20 %
Xylolgemisch	65 %	25 %	20 %

Aus solchen Konzentraten können durch Verdünnen mit Wasser Emulsionen jeder gewünschten Konzentration hergestellt werden.

<u>3. Lösungen</u>	a)	b)	c)	d)
Wirkstoff aus Tabelle 1	80 %	10 %	5 %	95 %
Aethylenglykol-monomethyl-äther	20 %	-	-	-
Polyäthylenglykol M G 400	-	70 %	-	-
N-Methyl-2-pyrrolidon	-	20 %	-	-
Epoxydiertes Kokosnussöl	-	-	1 %	5 %
Benzin (Siedegrenzen 160-190°C)	-	-	94 %	-

Die Lösungen sind zur Anwendung in Form kleinster Tropfen geeignet.

<u>4. Granulate</u>	a)	b)
Wirkstoff aus Tabelle 1	5 %	10 %
Kaolin	94 %	-
Hochdisperse Kieselsäure	1 %	-
Attapulgit	-	90 %

Der Wirkstoff wird in Methylenchlorid gelöst, auf den Träger aufgesprüht und das Lösungsmittel anschliessend im Vakuum abgedampft.

<u>5. Stäubemittel</u>	a)	b)
Wirkstoff aus Tabelle 1	2 %	5 %
Hochdisperse Kieselsäure	1 %	5 %
Talkum	97 %	-
Kaolin	-	90 %

Durch inniges Vermischen der Trägerstoffe mit dem Wirkstoff erhält man gebrauchsfertige Stäubemittel.

Formulierungsbeispiele für feste Wirkstoffe der Formel I

(% = Gewichtsprozent)

<u>6. Spritzpulver</u>	a)	b)	c)
Wirkstoff aus Tabelle 1	25 %	50 %	75 %
Na-Ligninsulfonat	5 %	5 %	-
Na-Laurylsulfat	3 %	-	5 %
Na-Diisobutylnaphthalinsulfonat	-	6 %	10 %
Octylphenolpolyäthylenglykoläther (7-8 Mol AeO)	-	2 %	-
Hochdisperse Kieselsäure	5 %	10 %	10 %
Kaolin	62 %	27 %	-

Der Wirkstoff wird mit den Zusatzstoffen gut vermischt und in einer geeigneten Mühle gut vermahlen. Man erhält Spritzpulver, die sich mit Wasser zu Suspensionen jeder gewünschten Konzentration verdünnen lassen.

7. Emulsions-Konzentrat

Wirkstoff aus Tabelle 1	10 %
Octylphenolpolyäthylenglykoläther (4-5 Mol AeO)	3 %
Ca-Dodecylbenzolsulfonat	3 %
Ricinusölpolyglykoläther (35 Mol AeO)	4 %
Cyclohexanon	30 %
Xylolgemisch	50 %

Aus diesem Konzentrat können durch Verdünnen mit Wasser Emulsionen jeder gewünschten Konzentration hergestellt werden.

8. Stäubemittel

	a)	b)
Wirkstoff aus Tabelle 1	5 %	8 %
Talkum	95 %	-
Kaolin	-	92 %

Man erhält anwendungsfertige Stäubemittel, indem der Wirkstoff mit den Trägerstoffen vermischt und auf einer geeigneten Mühle vermahlen wird.

9. Extruder Granulat

Wirkstoff aus Tabelle 1	10 %
Na-Ligninsulfonat	2 %
Carboxymethylcellulose	1 %
Kaolin	87 %

Der Wirkstoff wird mit den Zusatzstoffen vermischt, vermahlen und mit Wasser angefeuchtet. Dieses Gemisch wird extrudiert und anschliessend im Luftstrom getrocknet.

10. Umhüllungs-Granulat

Wirkstoff aus Tabelle 1	3 %
Polyäthylenglykol (M G 200)	3 %
Kaolin	94 %

Der fein gemahlene Wirkstoff wird in einem Mischer auf das mit Polyäthylenglykol angefeuchtete Kaolin gleichmässig aufgetragen. Auf diese Weise erhält man staubfreie Umhüllungs-Granulate.

11. Suspensions-Konzentrat

Wirkstoff aus Tabelle 1	40 %
Aethylenglykol	10 %
Nonylphenolpolyäthylenglykoläther (15 Mol AeO)	6 %
Na-Ligninsulfonat	10 %
Carboxymethylcellulose	1 %
37%ige wässrige Formaldehyd-Lösung	0,2 %
Silikonöl in Form einer 75%igen wässrigen Emulsion	0,8 %
Wasser	32 %

Der fein gemahlene Wirkstoff wird mit den Zusatzstoffen innig vermischt. Man erhält so ein Suspensions-Konzentrat, aus welchem durch Verdünnen mit Wasser Suspensionen jeder gewünschten Konzentration hergestellt werden können.

Biologische BeispieleBeispiel 12: Versuch mit Antidot und Herbizid an Weizen

Weizensamen werden in Plastiktöpfe, die 0,5 l Gartenerde enthalten, im Gewächshaus ausgesät. Nach dem Auflaufen der Pflanzen bis zum 2- bis 3-Blattstadium wird die als Antidot zu prüfende Substanz zusammen mit dem Herbizid 2-[4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy]-propionsäure-2-propinylester als Tankmischung appliziert.

20 Tage nach der Applikation wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenzen dienen dabei die mit dem Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Die Ergebnisse zeigen die folgenden Tabellen:

Tabelle 2

Aufwandmengen:

Herbizid 0,5 kg/ha

Antidot 0,5 kg/ha

Verbindung Nr.	relative Schutzwirkung in Prozent
1	50
3	50

Tabelle 3

Aufwandmengen:

Herbizid 0,75 kg/ha

Antidot 1,5 kg/ha

Verbindung Nr.	relative Schutzwirkung in Prozent	Verbindung Nr.	relative Schutzwirkung in Prozent
1	50	36	25
3	50	37	63
4	63	56	50
6	38	58	63
8	38	65	25
11	63	69	50
13	75	71	12,5
20	63	82	50
28	63	86	63

Fortsetzung Tabelle 3

Verbindung Nr.	relative Schutz- wirkung in Prozent	Verbindung Nr.	relative Schutz- wirkung in Prozent
91	50	377	63
132	75	378	63
155	12,5	379	63
287	50	380	50
289	63	381	63
291	50	383	75
293	63	384	75
295	50	385	63
299	63	386	63
307	12,5	387	63
345	25	388	63
358	12,5	393	38
359	75	394	12,5
360	63	395	25
361	75	396	12,5
362	65	397	25
363	25	398	38
364	38	399	50
365	25	400	25
366	25	401	38
367	12,5	402	63
368	50	403	12,5
369	50	404	50
370	63	405	12,5
371	63	406	12,5
372	63	407	25
373	63	409	50
374	63	410	63
375	63	411	50
376	75	412	65

Fortsetzung Tabelle 3

Verbindung Nr.	relative Schutz- wirkung in Prozent	Verbindung Nr.	relative Schutz- wirkung in Prozent
413	50	422	63
414	50	423	63
415	63	424	63
416	75	425	63
417	25	426	50
418	63	427	63
420	25	428	75
421	63	429	75

Beispiel 13: Versuch mit Antidot und Herbizid an Gerste

Gerstensamen werden in Plastiktöpfe, die 0,5 l Gartenerde enthalten, im Gewächshaus ausgesät. Nach dem Auflaufen der Pflanzen bis zum 2- bis 3-Blattstadium wird die als Antidot zu prüfende Substanz zusammen mit dem Herbizid 2-[4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy]-propionsäure-2-propinylester als Tankmischung appliziert.

20 Tage nach der Applikation wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenzen dienen dabei die mit dem Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Die Ergebnisse zeigen die folgenden Tabellen:

Tabelle 4

Aufwandmengen:

Herbizid 0,25 kg/ha

Antidot 0,25 kg/ha

Verbindung Nr.	relative Schutzwirkung in Prozent
3	38

Tabelle 5

Aufwandmengen:

Herbizid 0,5 kg/ha

Antidot 0,5 kg/ha

Verbindung Nr.	relative Schutzwirkung in Prozent
8	88

Tabelle 6

Aufwandmengen:

Herbizid 0,5 kg/ha

Antidot 1,5 kg/ha

Verbindung Nr.	relative Schutzwirkung in Prozent	Verbindung Nr.	relative Schutzwirkung in Prozent
4	12,5	132	38
6	75	287	50
13	12,5	289	63
20	50	291	25
28	88	293	75
58	50	295	38
86	25	359	63
91	12,5	360	63

Fortsetzung Tabelle 6

Verbindung Nr.	relative Schutz- wirkung in Prozent	Verbindung Nr.	relative Schutz- wirkung in Prozent
361	75	381	38
362	63	385	12,5
363	75	386	12,5
364	75	388	38
365	75	412	75
366	63	413	75
367	50	414	63
368	38	415	63
369	63	417	38
370	25	418	25
371	25	421	63
372	63	422	12,5
374	63	424	38
375	38	425	50
376	50	426	50
377	50	427	25
378	50	428	50
379	63	429	50
380	50		

Beispiel 14: Samenquellung Reis, Herbizid im Vorlaufverfahren

Reissamen werden 48 Stunden mit Lösungen der als Antidot zu prüfenden Substanz in einer Konzentration von 100 ppm getränkt. Man lässt die Samen dann etwa zwei Stunden trocknen, bis sie nicht mehr kleben. Plastikbehälter (Länge x Breite x Höhe = 25 x 17 x 12 cm) werden bis 2 cm unter dem Rand mit sandigem Lehm gefüllt. Die verquollenen Samen

werden auf die Bodenoberfläche des Behälters gesät und nur ganz schwach mit Erde bedeckt. Die Erde wird in einem feuchten (nicht sumpfigen) Zustand gehalten. Nun wird das Herbizid 2-Chlor-2',6'-di-äthyl-N-[2''-(n-propoxy)-äthyl]-acetanilid in verdünnter Lösung auf die Bodenoberfläche versprüht. Der Wasserstand wird entsprechend dem Wachstum der Pflanzen sukzessive erhöht. 18 Tage nach der Herbizidapplikation wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenz dienen dabei die mit dem Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle 7

Antidot Verbindung Nr.	Antidot ppm	Herbizid kg AS/ha	Relative Schutz- wirkung in %
8	100	0,25	50
404	100	0,25	38
359	100	0,25	25
381	100	0,25	63
422	100	0,25	63

Beispiel 15: Saatbeizung Reis, Herbizid im Vorlaufverfahren

Reissamen werden mit der als Antidot zu prüfenden Substanz in einen Glasbehälter gegeben und durch Schütteln und Rotation gut durchgemischt. Behälter (Länge x Breite x Höhe = 47 x 29 x 24 cm) werden mit sandiger Lehmerde gefüllt und die gebeizten Samen eingesät. Nach dem Bedecken des Samens mit Erde wird das Herbizid 2-Chlor-6'-äthyl-N-(2''-methoxy-1''-methyläthyl)-acet-o-toluidid in einer verdünnten Lösung auf die Bodenoberfläche versprüht. 20 Tage nach der Aussaat, wenn die Pflanzen das 3-Blattstadium erreicht haben, wird die Bodenoberfläche mit Wasser 4 cm hoch überschichtet. 30 Tage nach der Herbizidapplikation wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenz dienen

dabei die mit Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Die Verbindungen der Formel I zeigen auch in diesem Test eine gute Wirkung.

Beispiel 16: Saatbeizung Reis, Herbizid im Vorlaufverfahren

Reissamen der Sorte IR-36 werden mit der als Antidot zu prüfenden Substanz in einen Glasbehälter gegeben und durch Schütteln und Rotation gut durchgemischt. Plastikbehälter (Länge x Breite x Höhe = 47 x 29 x 24 cm) werden mit sandiger Lehmerde gefüllt und die gebeizten Samen eingesät. Nach dem Bedecken des Samens mit Erde wird das Herbizid 2-Chlor-6'-äthyl-N-(2"-methoxy-1"-methylläthyl)-acet-o-toluidid auf die Bodenoberfläche versprüht. 18 Tage nach der Aussaat wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenzen dienen dabei die mit Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Auch in diesem Test zeigen die Verbindungen der Formel I eine gute Wirkung.

Beispiel 17: Tankmischung im Voraufverfahren in Sorghum

Töpfe (oberer Durchmesser 6 cm) werden mit sandiger Lehmerde gefüllt und Sorghumsamen der Sorte 6522 eingesät. Nach dem Bedecken der Samen mit Erde wird die als Antidot zu prüfende Substanz zusammen mit dem Herbizid 2-Chlor-6'-äthyl-N-(2"-methoxy-1"-methylläthyl)-acet-o-toluidid in verdünnter Lösung als Tankmischung auf die Bodenoberfläche versprüht. 21 Tage nach der Herbizidapplikation wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenzen dienen dabei die mit Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle 8

Aufwandmengen:

Herbizid 1,5 kg/ha

Antidot 1,5 kg/ha

Verbindung Nr.	relative Schutzwirkung in Prozent
402	50
405	50
409	38

Beispiel 18: Saatbeizung Reis, Herbizid im Voraufverfahren

Reissamen werden mit der als Antidot zu prüfenden Substanz in einen Glasbehälter gegeben und durch Schütteln und Rotation gut durchgemischt. Behälter (Länge x Breite x Höhe = 47 x 29 x 24 cm) werden mit sandiger Lehmerde gefüllt und die gebeizten Samen eingesät. Nach dem Bedecken des Samens mit Erde wird das Herbizid 2-[4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy]-propionsäure-2-propinylester in einer verdünnten Lösung auf die Bodenoberfläche versprüht. 20 Tage nach der Aussaat, wenn die Pflanzen das 3-Blattstadium erreicht haben, wird die Bodenoberfläche mit Wasser 4 cm hoch überschichtet. 30 Tage nach der Herbizidapplikation wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenz dienen dabei die mit Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle 9

Antidot Verbindung Nr.	Antidot g AS/kg Samen	Herbizid kg AS/ha	Relative Schutz- wirkung in %
3	0,6	0,25	50
	0,4	0,25	63
	0,2	0,25	63

Beispiel 19: Saatbeizung Reis, Herbizid im Nachauflaufverfahren

Reissamen werden mit der als Antidot zu prüfenden Substanz in einen Glasbehälter gegeben und durch Schütteln und Rotation gut durchgemischt. Plastikbehälter (Länge x Breite x Höhe = 25 x 17 x 12 cm) werden mit sandiger Lehmerde gefüllt und die gebeizten Samen eingesät. Nach dem Bedecken des Samens mit Erde wird das Herbizid 2-[4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy]-propionsäure-2-propinylester im Nachauflaufverfahren appliziert. 21 Tage nach der Applikation wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenz dienen dabei die mit Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle 10

Antidot Verbindung Nr.	Antidot g AS/kg Samen	Herbizid kg AS/ha	Relative Schutz- wirkung in %
3	1	0,25	25
	0,8	0,25	25
	0,6	0,25	38

Beispiel 20: Saatbeizung Reis, Herbizid im Vorauflaufverfahren

Reissamen der Sorte IR-36 werden mit der als Antidot zu prüfenden Substanz in einen Glasbehälter gegeben und durch Schütteln und Rotation gut durchgemischt. Plastikbehälter (Länge x Breite x Höhe = 47 x 29 x 24 cm) werden mit sandiger Lehmerde gefüllt und die gebeizten Samen eingesät. Nach dem Bedecken des Samens mit Erde wird das Herbizid 2-[4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy]-propionsäure-2-propinylester auf die Bodenoberfläche versprüht. 18 Tage nach der Aussaat wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenzen dienen dabei die mit Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle 11

Antidot Verbindung Nr.	Antidot g AS/kg Samen	Herbizid kg AS/ha	Relative Schutz- wirkung in %
3	0,6	0,25	50
	0,4	0,25	63
	0,2	0,25	63

Beispiel 21: Saatbeizung Weizen, Herbizid im Nachauflaufverfahren

Weizensamen werden mit der als Antidot zu prüfenden Substanz in einen Glasbehälter gegeben und durch Schütteln und Rotation gut durchgemischt. Plastikbehälter (Länge x Breite x Höhe = 25 x 17 x 12 cm) werden mit sandiger Lehmerde gefüllt und die gebeizten Samen eingesät. Nach dem Bedecken des Samens mit Erde wird das Herbizid N-[(2-(2-Chloräthoxy)-phenyl)-sulfonyl]-N'-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-harnstoff im Nachauflaufverfahren appliziert. 21 Tage nach der Applikation wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenz dienen dabei die mit Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle:

Tabelle 12

Antidot Verbindung Nr.	Antidot g AS/kg Samen	Herbizid kg AS/ha	Relative Schutz- wirkung in %
8	0,25	1,0	25
	0,125	1,0	25
	0,25	0,5	12,5
	0,125	0,5	12,5

Beispiel 22: Saatbeizung in Weizen, Herbizid im Voraufverfahren

Weizensamen werden mit der als Antidot zu prüfenden Substanz in einen Glasbehälter gegeben und durch Schütteln und Rotation gut durchgemischt. Plastikbehälter (Länge x Breite x Höhe = 25 x 17 x 12 cm) werden mit sandiger Lehmerde gefüllt und die gebeizten Samen eingesät. Nach dem Bedecken des Samens mit Erde wird das Herbizid N-[(2-(2-Chloräthoxy)-phenyl)-sulfonyl]-N'-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-harnstoff auf die Bodenoberfläche gesprüht. 21 Tage nach der Herbizidapplikation wird die Schutzwirkung des Antidots in Prozent bonitiert. Als Referenz dienen dabei die mit Herbizid allein behandelten Pflanzen sowie die vollständig unbehandelte Kontrolle. Die Ergebnisse zeigt die nachfolgende Tabelle:

Tabelle 13

Antidot Verbindung Nr.	Antidot g AS/kg Samen	Herbizid kg AS/ha	Relative Schutz- wirkung in %
8	0,25	1,0	25
	0,125	1,0	25
8	0,25	0,5	25
	0,125	0,5	25
8	0,25	0,25	12,5
	0,125	0,25	12,5

Beispiel 23: Ertragssteigerung durch Wachstumsregulierung bei Soja

In Kunststoffbehältern mit einem Erde-Torf-Sandgemisch im Verhältnis 6:3:1 werden Sojabohnen der Sorte "Hark" angesät und in einer Klimakammer unter optimalen Bedingungen bezüglich Temperatur, Beleuchtung, Düngung und Bewässerung gehalten. Die Pflanzen entwickeln sich so in ca. 5 Wochen zum 5- bis 6-Trifolia-Blattstadium. In diesem Entwicklungsstadium werden die Pflanzen mit der wässrigen Brühe eines Wirkstoffes der Formel I bis zur guten Benetzung besprüht. Die Wirkstoffkonzentra-


tion beträgt 500 ppm Aktivsubstanz. Die Auswertung erfolgt 5 Wochen nach Applikation des Wirkstoffs. Im Vergleich zu unbehandelten Kontrollpflanzen weisen die mit erfindungsgemässen Wirkstoffen der Formel I behandelten Pflanzen eine merkliche Erhöhung der Anzahl und des Gewichts der geernteten Schoten auf. Als besonders wirksam erweisen sich die Verbindungen Nr. 58, 295 und 378.

Beispiel 24: Förderung des Wurzelwachstums bei Weizen und Soja

Verbindungen der Formel I werden als wässrige Dispersion, erhalten aus 25%igem Spritzpulver, angewendet. Der Versuch wird mit Samen durchgeführt, die in mit Erde gefüllte Plastikzylinder von 5 x 30 cm eingesät werden (10 Samen pro Zylinder), wobei a) die Samen vor der Einsaat in Aufwandmengen von 4-130 mg pro kg Saatgut behandelt werden oder b) unbehandelte Samen eingesät und der Boden mit der Wirkstoffdispersion in Aufwandmengen von 0,3 bis 3 kg pro Hektar besprüht wird. Die Zylinder werden in einer Klimakammer unter kontrollierten Bedingungen gehalten. Nach 10 Tagen werden Keimlinge durch vorsichtiges Waschen mit Wasser von der Erde befreit und Länge und Trockengewicht der Wurzeln gemessen. Von den Verbindungen der Formel I zeigen in diesem Test insbesondere die Verbindungen Nr. 364 und 369 eine gute Wirkung.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Agrarchemikalien, dadurch gekennzeichnet, dass man die Kulturpflanzen, Teile dieser Pflanzen oder Anbauflächen für Kulturpflanzen mit einer Verbindung der Formel I



(I),

worin

R₁, R₂ und R₃ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Nitro, Cyan, Alkyl oder Alkoxy,

R₄, R₅ und R₆ unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen oder Alkyl,

X einen aliphatischen, acyclischen, gesättigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen und

Y eine Carboxylgruppe oder ein Salz davon, eine Mercaptocarbonylgruppe oder ein Salz davon, eine Carbonsäureestergruppe, eine Carbonsäurethiolestergruppe, eine unsubstituierte oder substituierte Carbonsäureamidgruppe, ein cyclisiertes, unsubstituiertes oder substituiertes Derivat einer Carbonsäureamidgruppe oder eine Carbonsäurehydrazidgruppe oder

X und Y zusammen einen unsubstituierten oder substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring

bedeuten, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze und Metallkomplexe, oder einem Mittel, welches eine dieser Verbindungen enthält, behandelt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest, -COOR₇, -COSR₈ oder -CONR₉R₁₀ bedeutet, worin R₇, R₈ und R₉ für Wasserstoff oder einen gegebenenfalls substituierten

Alkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Cycloalkyl-, Phenyl- oder Naphthylrest oder einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest oder R_7 und R_8 auch für ein Kation oder R_9 auch für einen Alkoxyrest und worin R_{10} für Wasserstoff, Amino, mono- oder disubstituiertes Amino oder einen gegebenenfalls substituierten Alkyl-, Alkenyl-, Cycloalkyl- oder Phenylrest oder R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest stehen, oder X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze und Metallkomplexe.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-\text{COOR}_7$, $-\text{COSR}_8$, oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeutet, worin R_7 und R_8 unabhängig voneinander

- Wasserstoff oder ein Kation;
- Alkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, Alkylthio, Halogenalkoxy, Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, Hydroxyalkylthio, Alkoxycarbonyl, Dialkylamino, Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes Phenyl, gegebenenfalls substituiertes Phenoxy oder einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest substituiert ist;
- Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
- Alkinyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
- Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Alkyl oder Alkoxy substituiert ist;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, Alkyl, Alkoxy, Alkoxycarbonyl oder Halogenalkyl substituiert ist;

- Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder Alkyl substituiert ist; oder
 - einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest;
- R_9
- Wasserstoff;
 - Alkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Cyan, Hydroxy, Amino, Alkylamino, Dialkylamino, Hydroxyalkylamino, Di-(hydroxyalkyl)amino, Aminoalkylamino, Alkoxy, Alkoxycarbonyl, Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Alkyl oder Alkoxy substituiert ist, Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest substituiert ist;
 - Alkoxy;
 - Alkenyl;
 - Cycloalkyl;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, Alkyl, Alkoxy oder Halogenalkyl substituiert ist;
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Nitro oder Alkyl substituiert ist; oder
 - einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest; und
- R_{10}
- Wasserstoff;
 - Amino;
 - Dialkylamino;
 - Alkyl, welches unsubstituiert oder durch Hydroxy, Cyan oder Alkoxy substituiert ist;
 - Alkenyl;
 - Cycloalkyl; oder
 - Phenyl,

oder R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest bedeuten, oder X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze und Metallkomplexe.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-\text{COOR}_7$ steht, worin

- R_7 - Wasserstoff, ein Alkalimetall- oder ein quaternäres Ammoniumkation;
- $\text{C}_1\text{-C}_{18}$ -Alkyl;
 - $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, $\text{C}_1\text{-C}_8$ -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkylthio, $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Halogenalkoxy, $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Hydroxyalkylthio, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxycarbonyl, $\text{C}_2\text{-C}_{12}$ -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;
 - $\text{C}_1\text{-C}_6$ -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkyl oder $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkoxy substituiert ist, $\text{C}_3\text{-C}_6$ -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
 - $\text{C}_3\text{-C}_{10}$ -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
 - $\text{C}_3\text{-C}_6$ -Alkinyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
 - $\text{C}_3\text{-C}_8$ -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkyl oder $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkoxy substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxy, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxycarbonyl oder $\text{C}_1\text{-C}_2$ -Halogenalkyl substituiert ist;
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkyl substituiert ist; oder
 - einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S bedeutet.

5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel

I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-\text{COSR}_8$ steht, worin

- R_8
- Wasserstoff;
 - $\text{C}_1\text{-C}_{18}$ -Alkyl;
 - $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, $\text{C}_1\text{-C}_8$ -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkylthio, $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Halogenalkoxy, $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Hydroxyalkylthio, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxy-carbonyl, $\text{C}_2\text{-C}_{12}$ -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;
 - $\text{C}_1\text{-C}_6$ -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkyl oder $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkoxy substituiert ist, $\text{C}_3\text{-C}_6$ -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
 - $\text{C}_3\text{-C}_{10}$ -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
 - $\text{C}_3\text{-C}_6$ -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
 - $\text{C}_3\text{-C}_8$ -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkyl oder $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkoxy substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxy, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxy-carbonyl oder $\text{C}_1\text{-C}_2$ -Halogenalkyl substituiert ist;
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder $\text{C}_1\text{-C}_3$ -Alkyl substituiert ist; oder
 - einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S bedeutet.

6. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ steht, worin

- R_9 - Wasserstoff;
- C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_2-C_8 -Alkyl, welches durch Amino substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkyl, welches durch Halogen, Hydroxy, C_1-C_6 -Alkylamino, C_2-C_8 -Dialkylamino, C_2-C_6 -Hydroxyalkylamino, C_2-C_6 -Di-(hydroxyalkyl)-amino, C_2-C_6 -Aminoalkylamino oder C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Cyan, C_1-C_4 -Alkoxy, Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S substituiert ist;
 - C_1-C_3 -Alkoxy;
 - C_3-C_6 -Alkenyl;
 - C_3-C_8 -Cycloalkyl;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist; oder
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Nitro oder Methyl substituiert ist; und
- R_{10} - Wasserstoff;
- Amino;
 - C_2-C_4 -Dialkylamino;
 - C_1-C_6 -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Hydroxy oder Cyan substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkoxyalkyl;
 - C_3-C_6 -Alkenyl;
 - C_3-C_6 -Cycloalkyl; oder
 - Phenyl;

oder worin R_9 und R_{10} zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring, welcher noch 1 oder 2 weitere Heteroatome aus der Gruppe N, O und S enthalten kann, bedeuten.

7. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest steht.

8. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden.

9. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-\text{COOR}_7$ steht, worin

R_7 - Wasserstoff, ein Alkalimetallkation oder ein quaternäres Ammoniumkation ausgewählt aus der Gruppe Ammoniumkation, Trimethyl-, Triäthyl und Tri-(2-hydroxyäthylen)-ammoniumkation;

- $\text{C}_1\text{-C}_{18}$ -Alkyl;

- $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl, welches durch 1 oder 2 Hydroxygruppen substituiert ist;

- $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl, welches durch 1 bis 3 Chlor- oder Bromatome, eine Nitrogruppe, eine Cyanogruppe, eine $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxygruppe, eine $\text{C}_2\text{-C}_8$ -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine Hydroxy- $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxygruppe, eine Hydroxy- $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxycarbonylgruppe, eine Di-($\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl)-aminogruppe, einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor oder Methoxy substituiert ist, einen Cyclohexylrest, einen Furan-, Tetrahydrofuran-, Tetrahydropyran-, Pyridino-, Piperidino- oder Morpholinorest substituiert ist;

- $\text{C}_3\text{-C}_{10}$ -Alkenyl;

- $\text{C}_2\text{-C}_4$ -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;

- Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituiert ist;

- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 bis 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, C_1-C_4 -Alkyl oder Methoxy substituiert ist;
- Naphthyl; oder
- Pyridin

bedeutet.

10. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-COSR_8$ steht, worin

- R_8
- C_1-C_{12} -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine C_1-C_4 -Alkoxycarbonylgruppe substituiert ist; oder
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch ein Chloratom substituiert ist,

bedeutet.

11. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-CONR_9R_{10}$ steht, worin

- R_9
- Wasserstoff;
 - C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_2-C_8 -Alkyl, welches durch eine Aminogruppe substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;
 - C_2-C_4 -Alkyl, welches durch ein Chlor- oder Bromatom, eine C_1-C_4 -Alkylaminogruppe, eine Di- $(C_1-C_4$ -Alkyl)-aminogruppe, eine C_1-C_4 -Hydroxyalkylaminogruppe, eine Di- $(C_1-C_3$ -Hydroxyalkyl)-aminogruppe, eine C_1-C_4 -Alkoxygruppe oder eine C_1-C_4 -Alkoxycarbonylgruppe substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine Cyanogruppe oder einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor substituiert ist, einen Furanyl-, Tetrahydrofuran-, Piperidino- oder Morpholinorest substituiert ist;
 - C_1-C_3 -Alkoxy;
 - C_2-C_4 -Alkenyl;

- Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch eine Methylgruppe substituiert ist; oder
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, Cyano, Methyl, Aethyl, Methoxy und Trifluormethyl substituiert ist;

R₁₀ - Wasserstoff:

- C₁-C₆-Alkyl;
- C₁-C₄-Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe oder eine Cyano-
gruppe substituiert ist;
- C₂-C₄-Alkoxyalkyl;
- C₂-C₄-Alkenyl;
- Cyclohexyl; oder
- Phenyl, oder

R₉ und R₁₀ gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen unsubstituierten oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituierten Piperidino-, Tetrahydropyrimidino-, Morpholino- oder Imidazolylrest bedeuten.

12. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für einen unsubstituierten Oxazolin-2-yl-Rest steht.

13. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R₁, R₂, R₃, R₄, R₅ und R₆ die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X und Y zusammen einen unsubstituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R₁, R₂, R₃, R₄, R₅ und R₆ die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X und Y zusammen einen unsubstituierten Tetrahydrofuran-2-on-3-yl-Ring bilden.

15. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 , R_2 und R_3 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Nitro oder C_1 - C_3 -Alkyl und R_4 , R_5 und R_6 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C_1 - C_3 -Alkyl bedeuten, X die für Formel I angegebene Bedeutung hat und Y für einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-COOR_7$, $-COSR_8$ oder $-CONR_9R_{10}$ steht, worin

- R_7 - Wasserstoff, ein Alkalimetall- oder ein quaternäres Ammoniumkation;
- C_1 - C_{18} -Alkyl;
 - C_1 - C_{10} -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, C_1 - C_8 -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_1 - C_4 -Alkylthio, C_2 - C_6 -Halogenalkoxy, C_2 - C_6 -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_2 - C_6 -Hydroxyalkylthio, C_1 - C_4 -Alkoxy-carbonyl, C_2 - C_{12} -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;
 - C_1 - C_6 -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1 - C_3 -Alkyl oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3 - C_6 -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
 - C_3 - C_{10} -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
 - C_3 - C_6 -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
 - C_3 - C_8 -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, C_1 - C_3 -Alkyl oder C_1 - C_3 -Alkoxy substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkoxy, C_1 - C_4 -Alkoxy-carbonyl oder C_1 - C_2 -Halogenalkyl substituiert ist;
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder C_1 - C_3 -Alkyl substituiert ist; oder
 - einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S;

- R_8 - Wasserstoff;
- C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_1-C_{10} -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, C_1-C_8 -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_1-C_4 -Alkylthio, C_2-C_6 -Halogenalkoxy, C_2-C_6 -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_2-C_6 -Hydroxyalkylthio, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl, C_2-C_{12} -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;
 - C_1-C_6 -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
 - C_3-C_{10} -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
 - C_3-C_6 -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
 - C_3-C_8 -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist;
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl substituiert ist; oder
 - einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S,
- R_9 - Wasserstoff;
- C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_2-C_8 -Alkyl, welches durch Amino substituiert ist;

- C_2-C_6 -Alkyl, welches durch Halogen, Hydroxy, C_1-C_6 -Alkylamino, C_2-C_8 -Dialkylamino, C_2-C_6 -Hydroxyalkylamino, C_2-C_6 -Di-(hydroxyalkyl)-amino, C_2-C_6 -Aminoalkylamino oder C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Cyan, C_1-C_4 -Alkoxy, Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S substituiert ist;
 - C_1-C_3 -Alkoxy;
 - C_3-C_6 -Alkenyl;
 - C_3-C_8 -Cycloalkyl;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist; oder
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Nitro oder Methyl substituiert ist; und
- R_{10}
- Wasserstoff;
 - Amino;
 - C_2-C_4 -Dialkylamino;
 - C_1-C_6 -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Hydroxy oder Cyan substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkoxyalkyl;
 - C_3-C_6 -Alkenyl;
 - C_3-C_6 -Cycloalkyl; oder
 - Phenyl;

oder worin R_9 und R_{10} zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring, welcher noch 1 oder 2 weitere Heteroatome aus der Gruppe N, O und S enthalten kann, bedeuten, oder X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden.

16. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Verbindung der Formel I R_1 Wasserstoff, Chlor, Jod oder Brom, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff, Chlor, Jod, Brom, Nitro, Methyl oder Aethyl, R_4 Wasserstoff, R_5 Wasserstoff und R_6 Wasserstoff oder Methyl bedeuten, X die für Formel I angegebene Bedeutung hat und Y für einen unsubstituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-\text{COOR}_7$, $-\text{COSR}_8$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ steht, worin

- R_7 - Wasserstoff, ein Alkalimetallkation oder ein quaternäres Ammoniumkation ausgewählt aus der Gruppe Ammoniumkation, Trimethyl-, Triäthyl- und Tri-(2-hydroxyäthylen)-ammoniumkation;
- $\text{C}_1\text{-C}_{18}$ -Alkyl;
 - $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl, welches durch 1 oder 2 Hydroxygruppen substituiert ist;
 - $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl, welches durch 1 bis 3 Chlor- oder Bromatome, eine Nitrogruppe, eine Cyanogruppe, eine $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxygruppe, eine $\text{C}_2\text{-C}_8$ -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine Hydroxy- $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxygruppe, eine Hydroxy- $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxycarbonylgruppe, eine Di- $(\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl})$ -aminogruppe, einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor oder Methoxy substituiert ist, einen Cyclohexylrest, einen Furan-, Tetrahydrofuran-, Tetrahydropyran-, Pyridino-, Piperidino- oder Morpholinorest substituiert ist;
 - $\text{C}_3\text{-C}_{10}$ -Alkenyl;
 - $\text{C}_2\text{-C}_4$ -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;
 - Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 bis 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl oder Methoxy substituiert ist;
 - Naphthyl; oder
 - Pyridin,

- R_8 - C_1-C_{12} -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine C_1-C_4 -Alkoxy-carbonylgruppe substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch ein Chloratom substituiert ist,
- R_9 - Wasserstoff;
 - C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_2-C_8 -Alkyl, welches durch eine Aminogruppe substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;
 - C_2-C_4 -Alkyl, welches durch ein Chlor- oder Bromatom, eine C_1-C_4 -Alkylaminogruppe, eine Di- (C_1-C_4) -aminogruppe, eine C_1-C_4 -Hydroxyalkylaminogruppe, eine Di- (C_1-C_3) -Hydroxyalkylaminogruppe, eine C_1-C_4 -Alkoxygruppe oder eine C_1-C_4 -Alkoxy-carbonylgruppe substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine Cyanogruppe oder einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor substituiert ist, einen Furanyl-, Tetrahydrofuranyl-, Piperidino- oder Morphinorest substituiert ist;
 - C_1-C_3 -Alkoxy;
 - C_2-C_4 -Alkenyl;
 - Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch eine Methylgruppe substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, Cyano, Methyl, Aethyl, Methoxy und Trifluormethyl substituiert ist, und
- R_{10} - Wasserstoff;
 - C_1-C_6 -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe oder eine Cyano-
 gruppe substituiert ist;
 - C_2-C_4 -Alkoxyalkyl;
 - C_2-C_4 -Alkenyl;
 - Cyclohexyl; oder
 - Phenyl, oder

R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen unsubstituierten oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituierten Piperidino-, Tetrahydropyrimidino-, Morpholino- oder Imidazolylrest bedeuten, oder X und Y zusammen einen unsubstituierten Tetrahydrofuran-2-on-3-yl-Ring bilden.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass X für $-\text{CH}_2-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig R_1 Wasserstoff, Chlor, Jod oder Brom, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff, Chlor Brom, Nitro, Methyl oder Aethyl, R_4 und R_5 Wasserstoff, R_6 Wasserstoff oder Methyl und Y $-\text{COOR}_7$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeuten,

- i) R_7 nicht Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Diäthylamino substituiertes C_1-C_4 -Alkyl bedeutet und
- ii) R_9 nicht für Wasserstoff, C_1-C_4 -Alkyl, Allyl, unsubstituiertes oder p-Chlor-substituiertes Phenyl steht, wenn R_{10} Wasserstoff, C_1-C_4 -Alkyl, Allyl oder Phenyl bedeutet und
- iii) R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, nicht einen Morpholinring bilden.

18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass X für $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 Wasserstoff und Y $-\text{COOR}_7$ bedeuten, R_7 nicht Wasserstoff ist.

19. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass X für $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig R_1 Wasserstoff oder Chlor, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff oder Chlor, R_4 und R_5 Wasserstoff, R_6 Wasserstoff oder Methyl und Y $-\text{COOR}_7$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeuten,

- i) R_7 nicht für Aethyl steht und
- ii) R_9 nicht für Wasserstoff, Aethyl, sek.-Butyl oder Allyl steht, wenn R_{10} Wasserstoff, Aethyl, sek.-Butyl oder Allyl bedeutet.

20. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass X für $-\text{CH}(\text{A})-\text{CH}(\text{E})-$ steht, worin eines der Symbole A und E Wasserstoff und das andere eine Methylgruppe bedeutet.

21. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass X für $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4, \text{R}_5$ und R_6 Wasserstoff und Y $-\text{COOR}_7$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeuten, R_7 nicht Wasserstoff, Methyl oder Aethyl und R_9 und R_{10} nicht beide Aethyl bedeuten.

22. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass X für $-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-$ steht.

23. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass X für $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ steht.

24. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-3-yl-Ring bilden.

25. Verfahren nach Anspruch 1 zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln.

26. Verfahren nach Anspruch 25 zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Herbiziden.


27. Verfahren nach Anspruch 26 zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Diphenyläthern.

28. Verfahren nach Anspruch 26 zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von substituierten Pyridyloxyphenoxypropionsäureestern.

29. Verfahren nach Anspruch 28 zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von 2-[4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy]-propionsäure-2-propinylester.

30. Verfahren nach Anspruch 26 zum Schützen von Getreide.

31. Verbindung der Formel I



(I),

worin

R_1 , R_2 und R_3 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Nitro, Cyan, Alkyl oder Alkoxy,

R_4 , R_5 und R_6 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen oder Alkyl,
 X einen aliphatischen, acyclischen, gesättigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen und

Y eine Carboxylgruppe oder ein Salz davon, eine Mercaptocarbonylgruppe oder ein Salz davon, eine Carbonsäureestergruppe, eine Carbonsäurethiolestergruppe, eine unsubstituierte oder substituierte Carbonsäureamidgruppe, ein cyclisiertes, unsubstituiertes oder substituiertes Derivat einer Carbonsäureamidgruppe oder eine Carbonsäurehydrazidgruppe oder X und Y zusammen einen unsubstituierten oder substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bedeuten, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze und Metallkomplexe.

32. Verbindung nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-\text{COOR}_7$, $-\text{COSR}_8$ oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeutet, worin R_7 , R_8 und R_9 für Wasserstoff oder einen gegebenenfalls substituierten Alkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Cycloalkyl-, Phenyl- oder Naphthylrest oder einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest oder R_7 und R_8 auch für ein Kation oder R_9 auch für einen Alkoxyrest und worin R_{10} für Wasserstoff, Amino, mono- oder disubstituiertes Amino oder einen gegebenenfalls substituierten Alkyl-, Alkenyl-, Cycloalkyl- oder Phenylrest oder R_9 und R_{10}

gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, für einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest stehen, oder X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze und Metallkomplexe.

33. Verbindung nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-\text{COOR}_7$, $-\text{COSR}_8$, oder $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ bedeutet, worin R_7 und R_8 unabhängig voneinander

- Wasserstoff oder ein Kation
- Alkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, Alkylthio, Halogenalkoxy, Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, Hydroxyalkylthio, Alkoxycarbonyl, Dialkylamino, Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes Phenyl, gegebenenfalls substituiertes Phenoxy oder einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest substituiert ist;
- Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
- Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
- Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Alkyl oder Alkoxy substituiert ist;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, Alkyl, Alkoxy, Alkoxycarbonyl oder Halogenalkyl substituiert ist;
- Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder Alkyl substituiert ist; oder
- einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest;
- R_9 - Wasserstoff;
- Alkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Cyan, Hydroxy,

- Amino, Alkylamino, Dialkylamino, Hydroxyalkylamino, Di-(hydroxy-alkyl)amino, Aminoalkylamino, Alkoxy, Alkoxy-carbonyl, Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Alkyl oder Alkoxy substituiert ist, Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest substituiert ist;
- Alkoxy;
- Alkenyl;
- Cycloalkyl;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, Alkyl, Alkoxy oder Halogenalkyl substituiert ist;
- Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Nitro oder Alkyl substituiert ist; oder
- einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest; und
- R_{10} - Wasserstoff;
- Amino;
- Dialkylamino;
- Alkyl, welches unsubstituiert oder durch Hydroxy, Cyan oder Alkoxy substituiert ist;
- Alkenyl;
- Cycloalkyl; oder
- Phenyl,

oder R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest bedeuten, oder X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze und Metallkomplexe.

34. Verbindung nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-\text{COOR}_7$ steht, worin

- R_7 - Wasserstoff, ein Alkalimetall- oder ein quaternäres Ammoniumkation;
- $\text{C}_1\text{-C}_{18}$ -Alkyl;
- $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, $\text{C}_1\text{-C}_8$ -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, $\text{C}_1\text{-C}_n$ -Alkylthio, $\text{C}_n\text{-C}_n$ -Halogenalkoxy,

- C_2-C_6 -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_2-C_6 -Hydroxyalkylthio, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl, C_2-C_{12} -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;
- C_1-C_6 -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
 - C_3-C_{10} -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
 - C_3-C_6 -Alkinyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
 - C_3-C_8 -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist;
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl substituiert ist; oder
 - einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S bedeutet.
35. Verbindung nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-COSR_8$ steht, worin
- R_8 - Wasserstoff;
- C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_1-C_{10} -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, C_1-C_8 -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_1-C_4 -Alkylthio, C_2-C_6 -Halogenalkoxy, C_2-C_6 -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_2-C_6 -Hydroxyalkylthio, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl, C_2-C_{12} -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls

substituiertes Phenoxy substituiert ist;

- C_1-C_6 -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
- C_3-C_{10} -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
- C_3-C_6 -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
- C_3-C_8 -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist;
- Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl substituiert ist; oder
- einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S bedeutet.

36. Verbindung nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-CONR_9R_{10}$ steht, worin

- R_9 - Wasserstoff;
- C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_2-C_8 -Alkyl, welches durch Amino substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkyl, welches durch Halogen, Hydroxy, C_1-C_6 -Alkylamino, C_2-C_8 -Dialkylamino, C_2-C_6 -Hydroxyalkylamino, C_2-C_6 -Di-(hydroxyalkyl)-amino, C_2-C_6 -Aminoalkylamino oder C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Cyan, C_1-C_4 -Alkoxy, Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenen-

falls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S substituiert ist;

- C₁-C₃-Alkoxy;
 - C₃-C₆-Alkenyl;
 - C₃-C₈-Cycloalkyl;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy oder C₁-C₂-Halogenalkyl substituiert ist; oder
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Nitro oder Methyl substituiert ist; und
- R₁₀
- Wasserstoff;
 - Amino;
 - C₂-C₄-Dialkylamino;
 - C₁-C₆-Alkyl;
 - C₁-C₄-Alkyl, welches durch Hydroxy oder Cyan substituiert ist;
 - C₂-C₆-Alkoxyalkyl;
 - C₃-C₆-Alkenyl;
 - C₃-C₆-Cycloalkyl; oder
 - Phenyl;

oder worin R₉ und R₁₀ zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring, welcher noch 1 oder 2 weitere Heteroatome aus der Gruppe N, O und S enthalten kann, bedeuten.

37. Verbindung nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest steht.

38. Verbindung nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass R₁, R₂, R₃, R₄, R₅ und R₆ die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden.

39. Verbindung nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-\text{COOR}_7$ steht, worin

- R_7 - Wasserstoff, ein Alkalimetallkation oder ein quaternäres Ammoniumkation ausgewählt aus der Gruppe Ammoniumkation, Trimethyl-, Triäthyl und Tri-(2-hydroxyäthylen)-ammoniumkation;
- $\text{C}_1\text{-C}_{18}$ -Alkyl;
 - $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl, welches durch 1 oder 2 Hydroxygruppen substituiert ist;
 - $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl, welches durch 1 bis 3 Chlor- oder Bromatome, eine Nitrogruppe, eine Cyanogruppe, eine $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxygruppe, eine $\text{C}_2\text{-C}_8$ -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine Hydroxy- $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxygruppe, eine Hydroxy- $\text{C}_2\text{-C}_6$ -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkoxycarbonylgruppe, eine Di- $(\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl})$ -aminogruppe, einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor oder Methoxy substituiert ist, einen Cyclohexylrest, einen Furan-, Tetrahydrofuran-, Tetrahydropyran-, Pyridino-, Piperidino- oder Morpholinorest substituiert ist;
 - $\text{C}_3\text{-C}_{10}$ -Alkenyl;
 - $\text{C}_2\text{-C}_4$ -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;
 - Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 bis 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, $\text{C}_1\text{-C}_4$ -Alkyl oder Methoxy substituiert ist;
 - Naphthyl; oder
 - Pyridin

bedeutet.

40. Verbindung nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-\text{COSR}_8$ steht, worin

- R_8 - C_1 - C_{12} - Alkyl;
 - C_1 - C_4 -Alkyl, welches durch eine C_1 - C_4 -Alkoxy-carbonylgruppe substituiert ist; oder
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch ein Chloratom substituiert ist,

bedeutet.

41. Verbindung nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ steht, worin

- R_9 - Wasserstoff;
 - C_1 - C_{18} -Alkyl;
 - C_2 - C_8 -Alkyl, welches durch eine Aminogruppe substituiert ist;
 - C_2 - C_6 -Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;
 - C_2 - C_4 -Alkyl, welches durch ein Chlor- oder Bromatom, eine C_1 - C_4 -Alkylaminogruppe, eine Di- $(\text{C}_1$ - C_4 -Alkyl)-aminogruppe, eine C_1 - C_4 -Hydroxyalkylaminogruppe, eine Di- $(\text{C}_1$ - C_3 -Hydroxyalkyl)-aminogruppe, eine C_1 - C_4 -Alkoxygruppe oder eine C_1 - C_4 -Alkoxy-carbonylgruppe substituiert ist;
 - C_1 - C_4 -Alkyl, welches durch eine Cyanogruppe oder einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor substituiert ist, einen Furanyl-, Tetrahydrofuran-, Piperidino- oder Morpholinorest substituiert ist;
 - C_1 - C_3 -Alkoxy;
 - C_2 - C_4 -Alkenyl;
 - Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch eine Methylgruppe substituiert ist; oder
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, Cyano, Methyl, Aethyl, Methoxy und Trifluormethyl substituiert ist;

R_{10} - Wasserstoff:

- C_1-C_6 -Alkyl;
- C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe oder eine Cyano-
gruppe substituiert ist;
- C_2-C_4 -Alkoxyalkyl;
- C_2-C_4 -Alkenyl;
- Cyclohexyl; oder
- Phenyl, oder

R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen unsubstituierten oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituierten Piperidino-, Tetrahydropyrimidino-, Morpholino- oder Imidazolylrest bedeuten.

42. Verbindung nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Y für einen unsubstituierten Oxazolin-2-yl-Rest steht.

43. Verbindung nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X und Y zusammen einen unsubstituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden.

44. Verbindung nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und X und Y zusammen einen unsubstituierten Tetrahydrofuran-2-on-3-yl-Ring bilden.

45. Verbindung nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 , R_2 und R_3 unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, Nitro, oder C_1-C_3 -Alkyl und R_4 , R_5 und R_6 unabhängig voneinander Wasserstoff oder C_1-C_3 -Alkyl bedeuten, X die für Formel I angegebene Bedeutung hat und Y für einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-COOR_7$, $-COSR_8$ oder $-CONR_9R_{10}$ steht worin

R_7 - Wasserstoff, ein Alkalimetall- oder ein quaternäres Ammoniumkation;

- C_1-C_{16} -Alkyl;
 - C_1-C_{10} -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, C_1-C_8 -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_1-C_4 -Alkylthio, C_2-C_6 -Halogenalkoxy, C_2-C_6 -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_2-C_6 -Hydroxyalkylthio, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl, C_2-C_{12} -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;
 - C_1-C_6 -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
 - C_3-C_{10} -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
 - C_3-C_6 -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
 - C_3-C_8 -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist;
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl substituiert ist; oder
 - einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S;
- R_8 - Wasserstoff;
- C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_1-C_{10} -Alkyl, welches durch Halogen, Nitro, Cyan, Hydroxy, C_1-C_8 -Alkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann, C_1-C_4 -Alkylthio, C_2-C_6 -Halogenalkoxy, C_2-C_6 -Hydroxyalkoxy, welches durch ein oder mehrere Sauerstoff-

- atome unterbrochen sein kann, C_2-C_6 -Hydroxyalkylthio, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl, C_2-C_{12} -Dialkylamino oder durch gegebenenfalls substituiertes Phenoxy substituiert ist;
- C_1-C_6 -Alkyl, welches durch Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen gegebenenfalls substituierten, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rest mit 1 bis 3 Heteroatomen substituiert ist;
 - C_3-C_{10} -Alkenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder gegebenenfalls substituiertes Phenyl substituiert ist;
 - C_3-C_6 -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen oder Hydroxy substituiert ist;
 - C_3-C_8 -Cycloalkyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy, C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist;
 - Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro oder C_1-C_3 -Alkyl substituiert ist; oder
 - einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Heteroatomen aus der Gruppe N, O und S,
- R_9 - Wasserstoff;
- C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_2-C_8 -Alkyl, welches durch Amino substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkyl, welches durch Halogen, Hydroxy, C_1-C_6 -Alkylamino, C_2-C_8 -Dialkylamino, C_2-C_6 -Hydroxyalkylamino, C_2-C_6 -Di-(hydroxyalkyl)-amino, C_2-C_6 -Aminoalkylamino oder C_1-C_4 -Alkoxycarbonyl substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Cyan, C_1-C_4 -Alkoxy, Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, C_1-C_3 -Alkyl oder C_1-C_3 -Alkoxy substituiert ist, C_3-C_6 -Cycloalkyl oder einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring mit 1 bis 3 Hetero-

atomen aus der Gruppe N, O und S substituiert ist;

- C_1-C_3 -Alkoxy;
- C_3-C_6 -Alkenyl;
- C_3-C_8 -Cycloalkyl;
- Phenyl, welches unsubstituiert oder durch Halogen, Nitro, Cyan, C_1-C_4 -Alkyl, C_1-C_4 -Alkoxy oder C_1-C_2 -Halogenalkyl substituiert ist; oder
- Naphthyl, welches unsubstituiert oder durch Nitro oder Methyl substituiert ist; und

- R_{10}
- Wasserstoff;
 - Amino;
 - C_2-C_4 -Dialkylamino;
 - C_1-C_6 -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch Hydroxy oder Cyan substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkoxyalkyl;
 - C_3-C_6 -Alkenyl;
 - C_3-C_6 -Cycloalkyl; oder
 - Phenyl;

oder worin R_9 und R_{10} zusammen mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen 5- oder 6-gliedrigen, gesättigten oder ungesättigten, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Ring, welcher noch 1 oder 2 weitere Heteroatome aus der Gruppe N, O und S enthalten kann, bedeuten, oder X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden.

46. Verbindung nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 Wasserstoff, Chlor, Jod oder Brom, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff, Chlor, Jod, Brom, Nitro, Methyl oder Äthyl, R_4 Wasserstoff, R_5 Wasserstoff und R_6 Wasserstoff oder Methyl bedeuten, X die für Formel I angegebene Bedeutung hat und Y für einen unsubstituierten Oxazolin-2-yl-Rest, $-COOR_7$, $-COSR_8$ oder $-CONR_9R_{10}$ steht, worin

- R_7 - Wasserstoff, ein Alkalimetallkation oder ein quaternäres Ammoniumkation, ausgewählt aus der Gruppe Ammoniumkation, Trimethyl-, Triäthyl- und Tri-(2-hydroxyäthylen)-ammoniumkation;

- C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_1-C_{10} -Alkyl, welches durch 1 oder 2 Hydroxygruppen substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch 1 bis 3 Chlor- oder Bromatome, eine Nitrogruppe, eine Cyanogruppe, eine C_1-C_4 -Alkoxygruppe, eine C_2-C_8 -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine Hydroxy- C_1-C_4 -Alkoxygruppe, eine Hydroxy- C_2-C_6 -Alkoxygruppe, welche durch 1 oder 2 Sauerstoffatome unterbrochen ist, eine C_1-C_4 -Alkoxycarbonylgruppe, eine Di- $(C_1-C_4$ -Alkyl)-aminogruppe, einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor oder Methoxy substituiert ist, einen Cyclohexylrest, einen Furan-, Tetrahydrofuran-, Tetrahydropyran-, Pyridino-, Piperidino- oder Morpholinorest substituiert ist;
 - C_3-C_{10} -Alkenyl;
 - C_2-C_4 -Alkynyl, welches unsubstituiert oder durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;
 - Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 bis 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, C_1-C_4 -Alkyl oder Methoxy substituiert ist;
 - Naphthyl; oder
 - Pyridin,
- R_8
- C_1-C_{12} -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine C_1-C_4 -Alkoxycarbonylgruppe substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch ein Chloratom substituiert ist,
- R_9
- Wasserstoff;
 - C_1-C_{18} -Alkyl;
 - C_2-C_8 -Alkyl, welches durch eine Aminogruppe substituiert ist;
 - C_2-C_6 -Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe substituiert ist;

- C_2-C_4 -Alkyl, welches durch ein Chlor- oder Bromatom, eine C_1-C_4 -Alkylaminogruppe, eine Di- (C_1-C_4) -Alkyl-aminogruppe, eine C_1-C_4 -Hydroxyalkylaminogruppe, eine Di- (C_1-C_3) -Hydroxylalkyl-aminogruppe, eine C_1-C_4 -Alkoxygruppe oder eine C_1-C_4 -Alkoxy-carbonylgruppe substituiert ist;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine Cyanogruppe oder einen Phenylrest, welcher unsubstituiert oder durch Chlor substituiert ist, einen Furanyl-, Tetrahydrofuranyl-, Piperidino- oder Morpholinorest substituiert ist;
 - C_1-C_3 -Alkoxy;
 - C_2-C_4 -Alkenyl;
 - Cyclohexyl, welches unsubstituiert oder durch eine Methylgruppe substituiert ist;
 - Phenyl, welches unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Substituenten aus der Gruppe Chlor, Nitro, Cyano, Methyl, Aethyl, Methoxy und Trifluormethyl substituiert ist, und
- R_{10}
- Wasserstoff;
 - C_1-C_6 -Alkyl;
 - C_1-C_4 -Alkyl, welches durch eine Hydroxygruppe oder eine Cyanogruppe substituiert ist;
 - C_2-C_4 -Alkoxyalkyl;
 - C_2-C_4 -Alkenyl;
 - Cyclohexyl; oder
 - Phenyl, oder

R_9 und R_{10} gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen unsubstituierten oder durch 1 oder 2 Methylgruppen substituierten Piperidino-, Tetrahydropyrimidino-, Morpholino- oder Imidazolylrest bedeuten, oder X und Y zusammen einen unsubstituierten Tetrahydrofuran-2-on-3-yl-Ring bilden.

47. Verbindung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass X für $-CH_2-$ steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig R_1 Wasserstoff, Chlor, Jod oder Brom, R_2 Wasserstoff, R_3 Wasserstoff, Chlor, Brom, Nitro, Methyl oder Aethyl, R_4 und R_5 Wasserstoff, R_6 Wasserstoff oder

Methyl und Y -COOR₇ oder -CONR₉R₁₀ bedeuten,

- i) R₇ nicht Wasserstoff, unsubstituiertes oder durch Diäthylamino substituiertes C₁-C₄-Alkyl bedeutet und
- ii) R₉ nicht für Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl, Allyl, unsubstituiertes oder p-Chlor-substituiertes Phenyl steht, wenn R₁₀ Wasserstoff, C₁-C₄-Alkyl, Allyl oder Phenyl bedeutet und
- iii) R₉ und R₁₀ gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, nicht einen Morpholinring bilden.

48. Verbindung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass X für -CH₂-CH₂- steht, mit der Massgabe, dass, wenn R₁, R₂, R₃, R₄, R₅ und R₆ Wasserstoff und Y -COOR₇ bedeuten, R₇ nicht Wasserstoff ist.

49. Verbindung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass X für -CH(CH₃)- steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig R₁ Wasserstoff oder Chlor, R₂ Wasserstoff, R₃ Wasserstoff oder Chlor, R₄ und R₅ Wasserstoff, R₆ Wasserstoff oder Methyl und Y -COOR₇ oder -CONR₉R₁₀ bedeuten,

- i) R₇ nicht für Aethyl steht und
- ii) R₉ nicht für Wasserstoff, Aethyl, sek.-Butyl oder Allyl steht, wenn R₁₀ Wasserstoff, Aethyl, sek.-Butyl oder Allyl bedeutet.


50. Verbindung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass X für -CH(A)-CH(E)- steht, worin eines der Symbole A und E Wasserstoff und das andere eine Methylgruppe bedeutet.

51. Verbindung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass X für -CH₂-CH₂-CH₂- steht, mit der Massgabe, dass, wenn gleichzeitig R₁, R₂, R₃, R₄, R₅ und R₆ Wasserstoff und Y -COOR₇ oder -CONR₉R₁₀ bedeuten, R₇ nicht Wasserstoff, Methyl oder Aethyl und R₉ und R₁₀ nicht beide Aethyl bedeuten.

52. Verbindung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass X für -CH(C₂H₅)- steht.

53. Verbindung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass X für $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ steht.
54. Verbindung nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass X und Y zusammen einen gegebenenfalls substituierten Tetrahydrofuran-2-on-Ring bilden.
55. Mittel zum Schützen von Kulturpflanzen gegen schädigende Wirkungen von Agrarchemikalien, dadurch gekennzeichnet, dass es als aktive Komponente eine Verbindung der Formel I nach Anspruch 31 enthält.
56. Mittel nach Anspruch 55, dadurch gekennzeichnet, dass es die aktive Komponente zusammen mit Trägermaterial und/oder inerten Zuschlagstoffen enthält.
57. Mittel nach Anspruch 55, dadurch gekennzeichnet, dass es als aktive Komponente eine Verbindung der Formel I wie im Anspruch 1 definiert, zusammen mit einem Herbizid enthält.
58. Mittel nach Anspruch 57, dadurch gekennzeichnet, dass es als Herbizid einen Diphenyläther enthält.
59. Mittel nach Anspruch 57, dadurch gekennzeichnet, dass es als Herbizid einen substituierten Pyridyloxyphenoxypropionsäureester enthält.
60. Mittel nach Anspruch 59, dadurch gekennzeichnet, dass es als Herbizid 2-[4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy]-propionsäure-2-propinylester enthält.
61. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der

Formel II




worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und M für Wasserstoff, ein Alkali- oder Erdalkalimetallatom steht, mit einer Verbindung der Formel III



worin X und Y die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Z für einen abspaltbaren Rest steht, umgesetzt.

62. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, in denen Y für $-\text{COOR}_7$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Säurehalogenid der Formel IV




worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für ein Halogenatom steht, mit einer Verbindung der Formel V



worin R_7 die für Formel I angegebene Bedeutung hat und M' für Wasserstoff, ein Alkali- oder Erdalkalimetallatom steht, umgesetzt.

63. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, in denen Y für $-\text{COSR}_8$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Säurehalogenid der Formel VI




(VI),

worin $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für ein Halogenatom steht, mit einer Verbindung der Formel VII



worin R_8 die für Formel I angegebene Bedeutung hat und M'' für Wasserstoff, ein Alkali- oder Erdalkalimetallatom steht, umgesetzt.

64. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, in denen Y für $-\text{CONR}_9\text{R}_{10}$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass man ein Säurehalogenid der Formel VIII




(VIII),

worin $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für ein Halogenatom steht, mit einer Verbindung der Formel IX



worin R_9 und R_{10} die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben, umgesetzt.

65. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, in denen Y für $-\text{COOR}_7$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel X




worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Me für ein Alkalimetall-, Erdalkalimetall-, Blei- oder Silberatom steht, mit einer Verbindung der Formel XI



worin R_7 die für Formel I angegebene Bedeutung hat und Hal für ein Halogenatom steht, umgesetzt.

66. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, in denen Y für $-\text{COSR}_8$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel XII




worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Me' für ein Alkalimetall-, Erdalkalimetall-, Blei- oder Silberatom steht, mit einer Verbindung der Formel XIII



worin R_8 die für Formel I angegebene Bedeutung hat und Hal für ein Halogenatom steht, umgesetzt.

67. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, worin Y für $-\text{COOR}_7$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass man

eine Verbindung der Formel XIV




(XIV),

worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben, mit einer Verbindung der Formel XV




worin R_7 die für Formel I angegebene Bedeutung hat, umgesetzt.

68. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, worin Y für $-\text{COSR}_8$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel XVI




(XVI),

worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben, mit einer Verbindung der Formel XVII




worin R_8 die für Formel I angegebene Bedeutung hat, umgesetzt.

69. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, in denen Y für $-\text{COOR}_7$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel Ia




(Ia),

worin $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und R_7' die für R_7 in Formel I angegebene Bedeutung hat, mit einer Verbindung der Formel XVIII



worin R_7'' die für R_7 in Formel I angegebene Bedeutung hat und nicht mit R_7' identisch ist, umgesetzt.

70. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, in denen Y für $-COSR_8$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel Ib



(Ib),


worin $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und R_8' die für R_8 in Formel I angegebene Bedeutung hat, mit einer Verbindung der Formel XIX



worin R_8'' die für R_8 in Formel I angegebene Bedeutung hat und nicht mit R_8' identisch ist, umgesetzt.

71. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, worin Y für $-CONR_9R_{10}$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass

man eine Verbindung der Formel XX



(XX),


worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und R' für einen aliphatischen, acyclischen Kohlenwasserstoffrest steht, mit einer Verbindung der Formel XXI



(XXI),

worin R_9 und R_{10} die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben, umgesetzt.

72. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, in denen X für $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$ steht, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel XXII



(XXII),


worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 und R_6 die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben, mit einer Verbindung der Formel XXIII



worin Y die für Formel I angegebene Bedeutung hat, umgesetzt.

73. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 31, in denen Y für einen gegebenenfalls substituierten Oxazolin-2-yl-Rest steht, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der

Formel XXIV



(XXIV),

worin R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 und X die für Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Hal für ein Halogenatom, insbesondere ein Chlor- oder Bromatom steht, in Gegenwart eines säurebindenden Mittels cyclisiert.

74. Verfahren zur Ertragssteigerung von Kulturpflanzen, dadurch gekennzeichnet, dass man Kulturpflanzen oder Samen dieser Pflanzen mit einer Verbindung der Formel I gemäss Anspruch 31 behandelt.

75. Verfahren zur Förderung des Wurzelwachstums von Kulturpflanzen, dadurch gekennzeichnet, dass man Samen der Kulturpflanzen mit einer Verbindung der Formel I gemäss Anspruch 31 behandelt.

FO 7.5/SES/mg*/we*

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 094 349
A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 83810186.3

(51) Int. Cl.⁴: **C 07 D 215/26**
C 07 D 215/28, A 01 N 43/42

(22) Anmeldetag: 02.05.83

(30) Priorität: 07.05.82 CH 2841/82

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
16.11.83 Patentblatt 83/46

(88) Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts: 23.01.85

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR IT LI NL SE


(71) Anmelder: CIBA-GEIGY AG
Postfach
CH-4002 Basel(CH)

(72) Erfinder: Hubele, Adolf, Dr.
Obere Egg 9
CH-4312 Magden(CH)

(54) Verwendung von Chinolinderivaten zum Schützen von Kulturpflanzen.

(57) Beim Verfahren zum Schützen von Kulturpflanzen gegen
schädigende Wirkungen von Agrarchemikalien werden
Chinolinderivate der Formel

bedeuten, unter Einschluss ihrer Säureadditionssalze
und Metallkomplexe, oder Mittel, welche solche Derivate
enthalten, eingesetzt. Es werden auch neue Chinolinderivate
und ihre Herstellung beschrieben.



worin

R₁, R₂ und R₃ unabhängig voneinander Wasserstoff,
Halogen, Nitro, Cyan, Alkyl oder Alkoxy,

R₄, R₅ und R₆ unabhängig voneinander Wasserstoff,
halogen oder Alkyl, X einen aliphatischen, acyclischen, gesät-
tigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen
und

Y eine Carboxylgruppe oder ein Salz davon, eine mercap-
toacetylgruppe oder ein Salz davon, eine Carbonsäurees-
tergruppe, eine Carbonsäurethiolestergruppe, eine unsub-
stituierte oder substituierte Carbonsäureamidgruppe, ein cyc-
lisiertes, unsubstituiertes oder substituiertes Derivat einer
Carbonsäureamidgruppe oder eine Carbonsäurehydrazid-
gruppe oder

X und Y zusammen einen unsubstituierten oder sub-
stituierten tetrahydrofuran-2-on-Ring



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 2)
X	DE-A-2 546 845 (BASF) * Ansprüche 1, 2; Beispiel 1 *	1,55	C 07 D 215/26 C 07 D 215/28 C 07 D 401/12 C 07 D 405/12 C 07 D 413/12
A	--- US-A-3 351 525 (E. HODEL) * Anspruch 1 *	1	A 01 N 43/42
A	--- Chemical Abstracts Band 79, Nr. 9, 3 September 1973, Columbus, Ohio, USA; M. LEVI et al. "Derivatives of 8-hydroxyquinoline III", Seite 350, Spalte 2, Abstract Nr. 53154r & Tr. Nauchnoizsled. Khim.-Farm. Inst. Band 8, 1972, Seiten 135-145 -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 2)
			A 01 N 43/42 C 07 D 215/26 C 07 D 215/28 C 07 D 401/12 C 07 D 405/12 C 07 D 413/12
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 03-10-1984	
		Prüfer KNAACK M	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet		E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	
A : technologischer Hintergrund		L : aus andern Gründen angeführtes Dokument	
O : mündliche Offenbarung			
P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	